

Temperatur und Niederschläge in Nordamerika.

INAUGURAL-DISSERTATION

verfaßt

und

der hohen philosophischen Fakultät der Universität Marburg

zur

Erlangung der Doctorwürde

vorgelegt

von

Carl Martin Otto Dersch

aus Ortenberg.

Marburg.

1883.

Herrn

Professor Dr. J. Rein

in dankbarer Verehrung

gewidmet.

Temperatur und Niederschläge in Nordamerika.

In der vorliegenden Betrachtung der Temperatur und der Niederschläge Nordamerikas beschränke ich mich auf den englisch redenden Teil desselben und auf Grönland. Von einer Besprechung der klimatischen Verhältnisse Mexikos mußte ich absehen, um nicht einestheils den Rahmen dieser Abhandlung allzuweit auszudehnen und um anderseits nicht genötigt zu sein, mit unzureichenden Daten, namentlich bezüglich der Niederschläge, rechnen zu müssen.

A. Temperatur.

Allgemeiner Charakter der Temperatur.

Nordamerika besitzt ganz eigentümliche klimatische Verhältnisse, wie wir sie nur annähernd bei Asien wiederfinden. Die Temperatur seiner Atmosphäre unter den verschiedenen Breitengraden, vom Wendekreise des Krebses bis fast zum Nordpole, schwankt zwischen den Extremen $49,9^{\circ}$ und $-58,7^{\circ}$ C., was eine Amplitude von $108,6^{\circ}$ C. ergibt. Man darf sich über diese ungeheure Temperaturverschiedenheit nicht wundern, wenn man bedenkt, daß das hier in Betracht kommende Gebiet zwischen Breitengraden gelegen ist, unter welchen einerseits ein halbes Jahr die Sonne nicht auf- und untergeht, anderseits sie ihre Strahlen beinahe senkrecht zur Erde sendet, und das auch nach seiner vertikalen Erhebung dazu geschaffen ist, große Temperaturextreme hervorzubringen. Die Ausdehnung und Lage Nordamerikas wirken auf das Klima in entgegengesetzter Richtung, wie die des alten Kontinents. Vergleicht man die Ausdehnung und Lage beider Kontinente, so springt vor allem bei letztem die Ansammlung von Land in der warmen und seine Verminderung in der kalten Zone in die Augen, was eine Erhöhung der Temperatur zur Folge hat, während umgekehrt die Verminderung des Landes in der warmen und seine massige Ausdehnung in der kalten Zone, wie es bei Nordamerika der Fall ist, die Wärme vermindert. Ein bedeutender Teil Nordamerikas erstreckt sich weit über den Polarkreis hinaus, wie dies in ähnlicher Weise in der alten Welt kaum der Fall ist. Aber im Süden unsers Gebietes finden wir nichts, was die arabischen, indischen und afrikanischen Landkomplexe, die den nördlicheren Gegenden ihre

Wärme zuführen, ersetzen könnte. Bedenkt man, daß das Wasser die doppelte Wärme nötig hat, um sich bis zu demselben Grade zu erhitzen als das Land, so ist klar, daß Nordamerika im ganzen genommen nicht denselben Temperaturgrad aufweisen kann als die alte Welt; denn der Golfstrom führt das warme Meerwasser der Äquatorialgegend von der Ostküste Nordamerikas weg, während hier kalte polare Strömungen ungehindert einen ansehnlichen Teil des Festlandes beeinflussen und seine Temperaturen herabdrücken.

A. Übersicht der Temperaturverhältnisse der verschiedenen Distrikte.

Eine orographische Karte von Nordamerika zeigt die auffallend ungleiche Verteilung von Hochland und Tiefland. Während der östliche Teil keine bedeutenden Höhenzüge aufweist, ist der westliche fast ausschließlich vom Hochgebirge bedeckt. Faßt man diese Verhältnisse ins Auge, so ergibt sich im großen und ganzen ein Bild des Klimas dieser beiden Hälften. Wenn auch das Alleghany-Gebirge sich in einer Länge von 560 Kilometer durch den östlichen Teil hinzieht, so ist dasselbe im allgemeinen zu niedrig, um große Temperaturdifferenzen auf seinem Ost- und Westabhange hervorzubringen.

In dem östlich der Rocky Mountains gelegenen Teile Nordamerikas erscheint die Verteilung der Wärme normal, wie der Verlauf der Isothermen zeigt, welche mit nicht großen Abweichungen den Parallelkreisen folgen, in dem westlichen Teile ist sie ganz und gar unregelmäßig. Im Winter hat die Nähe des Golfstromes an der atlantischen Küste die Wirkung, die Temperatur in der Nachbarschaft des Ozeans zu erhöhen; die Temperaturerhöhung beträgt 0° in Florida, ungefähr 2° in Nord-Carolina und ungefähr $4\text{--}5^{\circ}$ in Massachusetts; in den Sommermonaten ist die Wirkung umgekehrt, wie die Isothermen durch ihre Krümmung nach Süden zeigen, was von der kalten Strömung herrührt, die zwischen der Küste und dem Golfstrom südwärts fließt. Die Depression wird noch dadurch größer, daß die hier herrschenden Winde die warme Luft des Golfstroms seewärts führen. Auf die Durchschnittstemperatur des Jahres hat die Nachbarschaft des Ozeans hier keine Wirkung.

Das Klima der atlantischen Seite unsers Gebietes bis etwa zur Mitte des Kontinentes charakterisiert sich durch hohe Sommertemperaturen, niedere im Winter und plötzlichen Wechsel zwischen nicht unbedeutenden Kälte- und Wärme-graden.

Es ist von Hann nachgewiesen worden, daß die Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. die Wärmesprünge von einem

Tage zum andern, in den östlichen und inneren Staaten der Union bedeutend gröfser sind als in Italien, England und Deutschland und jenen von W-Sibirien und NE-Europa gleichkommt. Die extremen täglichen Temperaturdifferenzen sind ein Effekt des den Vorübergang der Stürme begleitenden Windwechsels zwischen SE und NW. (Zeitschrift für Meteorologie 1881, S. 253.)

Auffallend sind die hohen Sommertemperaturen, selbst im nördlichen Teile von Nordamerika. Ein sehr bemerkenswertes Beispiel bietet Fort Simpson, das in einer Breite von $62^{\circ} 10'$ gelegen, ein gröfseres Maximum (40° C.) hat als Stationen am Golfe von Mexiko, wie z. B. New-Orleans ($37,7^{\circ}$ C.) und Key West ($36,6^{\circ}$ C.) Dieses rührt einerseits von der längern Insolation und von der Trockenheit der Luft in Fort Simpson und anderseits von dem grofsen Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf den südlichen Stationen her. Das ganze zwischen den Parallelen 30° und 82° gelegene Gebiet wird von den Jahresisothermen 25° C. und -20° C. umschlossen, mithin beträgt die Differenz 45° und die Abnahme der Wärme für einen Breitengrad $0,9^{\circ}$ C., während nach Humboldt dieselbe für das westliche Europa $0,6^{\circ}$ C. ist. Nach Doves Bestimmungen der normalen mittlern Jahrestemperatur besitzt der ganze Kontinent von Nordamerika bis auf die nordwestliche Küste und Florida eine zu geringe mittlere Jahrestemperatur.

Das Tiefland des östlichen Teiles von Nordamerika erstreckt sich ungefähr bis zu dem 95. Meridian westl. von Gr. Von hier an beginnt ein allmählicher Anstieg, der uns bis zum 100. Meridian in eine Höhe von 600 m und bis zum 105. Meridian bis über 1500 m führt. Die klimatischen Zustände dieses Gebietes sind im ganzen dieselben wie die des im Osten gelegenen Tieflandes.

Einen grofsen Kontrast bilden die klimatischen Verhältnisse der Felsengebirge, die sich jenseit der Plains erheben. Die schärfsten Gegensätze treten an die Stelle der seither beobachteten Gleichförmigkeit. Der westliche Teil Nordamerikas zerfällt in zwei klimatisch sehr von einander abweichende Teile, nämlich in das Plateau der Felsengebirge mit extremen Temperaturerscheinungen und in den schmalen Küstenstrich am Stillen Ozean mit seiner im Sommer und Winter sich ziemlich gleichbleibenden Temperatur, mit grofser Trockenheit im Sommer und bedeutendem Regenfalle im Winter.

Im Norden reiht sich an das Festland ein Inselmeer an, das für die Temperaturverhältnisse des nördlichen Amerikas von der gröfsten Bedeutung ist. Da durch die grofse Inselmenge westlich von Grönland und im Norden des Festlandes die Eisbildung in den seichten Meeresteilen sehr gefördert

wird, so wird im Winter hier durch die Eisdecke sozusagen ein Kontinent geschaffen, über dem sich die niedrigsten Temperaturen entwickeln können. Große Kälte im Winter, geringe Sommerwärme und wenig Niederschläge charakterisieren das Klima dieser Inselwelt.

In dem nordöstlich gelegenen Grönland ist die mit dem Kontinente einen so starken Kontrast bildende verhältnismäßig milde Wintertemperatur auffallend. Als Ursache dieser Erscheinung wird das offen bleibende Meeresbecken im Smithsunde und die Überlagerung Grönlands mit mächtigen Gletschermassen angesehen, die beständig eine Temperatur von 0° besitzen, welche auch während der äußeren Winterkälte infolge der schwachen Wärmeleitung des Eises nicht verloren geht. Auch hier macht sich die Verschiedenheit der Temperatur der Ost- und Westküste fühlbar. Geringer Schneefall, überwiegende Anzahl von Windstillen bei klarem, heiterem Himmel sind die hauptsächlichsten Merkmale des Klimas von Grönland.

B. Spezielle Betrachtung der Temperaturverhältnisse in den verschiedenen Distrikten.

1. Temperaturverhältnisse Grönlands.

Das nordwestliche Küstengebiet Grönlands ist das Arbeitsfeld mehrerer wissenschaftlicher Expeditionen gewesen. Am weitesten nördlich drang die englische Expedition unter Capt. Nares vor und dieselbe überwinterte 1875/76 in Floeberg Beach, $82^{\circ} 27' N$, und in Discovery Bay, $81^{\circ} 44' N$, wobei meteorologische Beobachtungen gemacht wurden. Von den vorausgegangenen meteorologischen Beobachtungen in diesem Gebiete sind noch die des Dr. Bessel von der Expedition der Polaris von größerm Werte.

Für die Nordostküste lieferte die zweite deutsche Nordpol-expedition ein interessantes Material.

Nehmen wir Floeberg Beach als nördlichste und Lichtenau als südlichste meteorologische Station an, so liegt nach den hier gemachten Beobachtungen Grönland innerhalb der Isothermen von $0,5^{\circ}$ und $-19,8^{\circ} C.$, die Differenz beträgt also $19,3^{\circ}$. Ganz anders gestaltet sich das Verhältnis, vergleicht man die mittlern Winter- und Sommertemperaturen. Zu Floeberg Beach beträgt die mittlere Sommertemperatur $1,3^{\circ}$, zu Lichtenau $6,1^{\circ}$, die mittlere Wintertemperatur dagegen zu Polarisbay $-29,1^{\circ}$, zu Godthaab $-5,7^{\circ}$. Diese Data zeigen die fast völlig gleichmäßige Sommer- und die verschiedene Wintertemperatur. Das auffallendste Ergebnis der letzten amerikanischen Nordpol-expedition war die vergleichsweise milde Wintertemperatur zu Polarisbay und Polarishaus. Während Van Rensselaer Harbor,

in der Breite von $78^{\circ} 37'$ gelegen, eine mittlere Wintertemperatur von $-33,7^{\circ}$ aufweist, finden wir in Polarisbay, $81^{\circ} 36'$ N. Br., nur eine solche von $-29,1^{\circ}$.

Ebenso erfreute sich die Expedition, die den Winter 1860/61 in Port Foulke zubrachte, einer milden Wintertemperatur. Gegen Mitte November trat Tauwetter ein, und noch am 28. und 29. dieses Monats erhob sich die Temperatur auf den Nullpunkt und auf starken Schneefall folgten Regenschauer, ein außerordentliches Ereignis für den Winter dieser Breiten. Das Meer friert in Port Foulke nicht ganz zu, sondern es sind große Strecken offenen Wassers vorhanden. Besonders zeichnet sich die Westküste Grönlands durch ihre relativ hohe Wintertemperatur aus. Die Januarisotherme von -15° liegt etwa um 18° nördlicher in Grönland als im Innern von Nordamerika, wo auf der gleichen Parallele von 67° die Januarisotherme von -32° verläuft. Aber auch an der Westküste findet sich unter gleichen Breiten keine ähnliche Wintermilde wie an der Südwestküste Grönlands, noch weniger aber wiederholt sich diese an der analogen Ostseite Asiens, wo Kamtschatka mit gleichen Januarisothermen um 10 Breitengrade südlicher als Grönland gelegen ist. (Petermanns Mitteil. 1864.)

Wie in der allgemeinen Übersicht schon angedeutet, sieht man die Ursache dieser gemilderten Wintertemperatur in dem stets offen bleibenden Smithsunde, dem sogenannten Nordwasser der Walfischfänger, welches die Wirkung einer warmen Meeresströmung ist, die an der Westseite von Grönland als ein Zweig des Golfstromes nach dem obern Ende der Baffinsbay geht, dort umbiegt und nach Süden zurückfließt. Diese offene Wasseroberfläche zwischen großen, mit Schnee und Eis vollkommen bedeckten Ländermassen hat in der kalten Jahreszeit eine starke Tendenz zur Bildung eines barometrischen Minimums über der Davisstraße; es ist vielleicht das konstanteste auf dem nordatlantischen Ozean und wird dadurch ein sehr wichtiger klimatischer Faktor für die angrenzenden Länder. Es zieht nämlich die warmen südöstlichen Winde vom Atlantischen Ozean über Süd- und Westgrönland hinauf und ermöglichte auf diese Weise die Kolonisation des Küstengebiets. Die Temperatur des Meerwassers war zu Van Rensselaer Harbor 1,2 m unter der Oberfläche im Dezember $-1,8$; Januar $-1,8$; Februar $-1,8$; März $-1,8$; April $-1,7$; Mai $-1,6$; Juni $-0,9$; Juli $+0,1$; August $-0,1$; September -1 ; Oktober $-1,2$; November $-1,7^{\circ}$. Ferner wirken die Niederschläge temperaturerhöhend. Kombiniert man die Differenz zwischen beobachteter und mittlerer Temperatur zu Van Rensselaer Harbor für alle Stunden, während welchen Schnee fiel, so findet man eine große Regelmäßigkeit in den monatlichen Werten, die eine

Erhöhung der Temperatur ausdrücken in der Zeit, in welcher die Niederschläge erfolgten. Die durchschnittliche Temperaturerhöhung durch Niederschlag beträgt zu Van Renssler Harbor im Winter $8,3^{\circ}$, zu Port Foulke $4,7^{\circ}$.

Für die Temperaturverhältnisse Grönlands ist von großer Wichtigkeit das Auftreten eines Ost- oder Südostwindes, grönländischer Föhn genannt. Dieser, über das hohe eisbedeckte Innenland herwehend und direkt in die Fjorde einfallend, erhöht die Temperatur im Winter oft um 25° , durchschnittlich im Herbst und Frühling etwa um 11° , im Sommer um 12° bis 16° über die betreffende Mitteltemperatur. Dieser warme Wind ist in den mittlern Teilen Grönlands seltener als an der südlichen und nördlichen Westküste.

Betrachten wir einen speciellen Fall.

Die Mitteltemperatur während der Herrschaft des Föhns vom 28. November bis 11. Dezember 1875 war zu

Godthaab	64° N.	$+2,6^{\circ}$
Jakobshavn	69°	$+3,8^{\circ}$
Upernivik	73°	$-0,3^{\circ}$

Die Maxima waren zu

Godthaab	11° (Ende November)
Jakobshavn	10° (2. Dezember)
Upernivik	10° (25. November),

während die normale Temperatur -15° ist.

Hoffmeyer hat für obige Föhnperiode die Luftdruckverhältnisse und die allgemeinen Luftströmungen über Nordamerika und Europa untersucht und für mehr als 100 Stationen den mittlern Luftdruck und die mittlere Temperatur um 8^h a. m. vom 23. November bis 3. Dezember 1875, der Periode der größten Intensität des Föhn, berechnet. Ein Luftdruckmaximum von 775^{mm} lag etwas südlich von Island und ein Minimum von 745^{mm} zwischen Labrador und Südgrönland. Die Luftdruckverteilung erklärt im allgemeinen die E- und SE-Winde an der grönländischen Westküste. Die Temperatur war in Canada, Island und Großbritannien viel niedriger als in Westgrönland; zu Jakobshavn war sie während 9 Tagen in der Mitte des Winters höher als in Norditalien, zu Upernivik in der Mitte der Polarnacht höher als in Südfrankreich.

Nach 20jährigen Beobachtungen zu Jakobshavn (1840—51, 1866—74) weht der Föhn in der Regel monatlich an 2—3 Tagen. (Zeitschrift für Meteorologie 1878.)

Die Beobachtungen der letzten englischen Nordpolexpedition unter Capt. Nares 1875/76 in Floeberg Beach, $82^{\circ} 27' \text{ N.}$, und Discovery Bay, $81^{\circ} 44' \text{ N.}$ (Zeitschrift für Meteorologie 1880, S. 190) liefern uns den Beweis, daß im arktischen Klima

Windschutz Schutz gegen Wärmezufuhr bedeutet. Discovery Bay ist von ESE durch N bis W durch Berge gedeckt, welche bis 600 m ansteigen. Nur der SE-Wind konnte die Station direkt erreichen. Floeberg Beach, 101 km nordöstlich von Discovery Bay, hat eine weniger geschützte Lage, nur von SSW durch SW bis NNW gibt es Berge von 150—300 m Höhe. Namentlich im Oktober und November, aber auch noch im Dezember 1875 erwies sich die weniger windgeschützte Lage dieser Station für die Wärmeverhältnisse günstig. Bei schwächern S- und SW-Winden war diese nördlicher gelegene Station mehrmals und längere Zeit 8—10° wärmer als die südlichere, wo Kalmen herrschten; selbst die Mitteltemperatur dieser 3 Monate blieb im Norden höher. Auch dem warmen SE war Floeberg Beach mehr exponiert. Am 3. Dezember stieg daselbst die Temperatur über Null (1,7° um 8^h p. m.), während in Discovery Bay das Maximum nicht einmal —15° erreichte.

Die Temperaturmaxima sind nicht auf den SE allein beschränkt, sondern sie werden auch durch den SW und N herbeigeführt. In 24 Beobachtungsmonaten traten zu Frederikshaab, 62° N.Br., die Temperaturmaxima 14mal bei SE, 7mal bei SW, 2mal bei N und 1mal bei Veränderlich ein; es waren also nur die beiden N Landwinde, SE und SW dagegen Seewinde. Der im Winter sehr häufige Landwind aus NE begleitete kein einziges Mal das Temperaturmaximum. Es scheint daher, daß in Frederikshaab die dynamische Erwärmung beim Herabsteigen der Luft eine bedeutende Rolle beim Zustandekommen des Temperaturmaximums nicht spielt, jedoch alterieren obige Data nicht die Hypothese des Föhncharakters der warmen Winde im mittlern und nördlichen Teile Westgrönlands.

Die größte tägliche Amplitude tritt in den verschiedenen Teilen Grönlands zu verschiedenen Zeiten auf. In Polarisbay und Rensselaer Harbor stellt sie sich im April, zu Port Foulke aber im März ein. Die mittlere tägliche Schwankung ist im Winter und Sommer naturgemäfs gering; sie beträgt zu Rensselaer Harbor im Januar 0,7°, im November 0,5°, im Juli 1,8°; am größten ist sie im April mit 5,5°.

Die amerikanische Polarregion hat die Eigentümlichkeit, daß das Maximum der Winterkälte im Februar, ja selbst erst im März eintritt, während um den asiatischen Kältepol herum durchgängig der Januar das niedrigste Temperaturmittel hat und im Februar schon eine erhebliche Zunahme der Wärme fühlbar wird. Die Zunahme der Differenz zwischen Winter- und Sommertemperatur ist auf der Westküste Grönlands folgende:

Jakobshavn	69° 12' N.Br.,	Differenz 22,9°
Omenak	70° 41'	„ 25,5°
Upervik	72° 47'	„ 27,9°
Wolstenholme Sound	76° 34'	„ 30,4°
Port Foulke	78° 18'	„ 32,1°
Rensselaer Harbor .	78° 37'	„ 34,4°
Floeberg Beach . . .	82° 27'	„ 36,3°

Nach den Beobachtungen der zweiten deutschen Nordpol-expedition unter Capt. Koldewey ist die bemerkenswerteste Eigenschaft des Klimas auf der Ostküste Grönlands das Vorherrschen und die ungemeine Heftigkeit der Nordwinde, die von September bis April herrschen, und nur in den Monaten Mai bis Juli kommt der Wind mehr von Süden und Osten, während im August reiner West weht. Im Sommer sind die Winde so leicht, daß ein Segelschiff selten Kraft genug haben möchte, um durch das Eis sich hindurcharbeiten zu können. Die Nordwinde werden durch die Depression im Südwesten von Island hervorgerufen, wo der mittlere Luftdruck nur 746^{mm} im Januar erreicht.

Nach den Berichten von Dr. Pantsch und der zweiten deutschen Nordpol-expedition bleibt auf der Sabine-Insel und an der Ostküste Grönlands die Temperatur der Luft bis Ende Mai unter 0°. Im Sommer taut der Boden bis zu einer Tiefe von 0,5 m auf, und die Sommertemperatur, obgleich nicht hoch, reicht aber, weil regelmässig und beständig, hin, eine kräftige Vegetation hervorzubringen. In den Thälern des Innern, wo die Wärme beträchtlicher ist, zeigt sich die Vegetation mehr entwickelt, als an der Küste. Sie bieten weite Räume mit Grün bedeckt dar, doch zeigt Grönland selbst an seiner südlichen Spitze wegen der Kürze des Sommers kaum noch Spuren von Baumvegetation. Das Klima ist ein Mittelding zwischen gemäßigtem und kaltem; man leidet zugleich unter der Unbeständigkeit des erstern und der Kälte des letztern.

Aus den Temperaturbeobachtungen der Hansa an der Ostküste und den mehrjährigen Beobachtungen in den dänischen Niederlassungen an der Westküste Grönlands hat Capt. Koldewey die Wärmeabnahme für einen Breitengrad zwischen 61° und 64° N. Br. berechnet:

	Novbr.	Dezbr.	Jan.	Febr.	März	April	Mai
Ostgrönland	0,4	0,8	2,0	1,6	1,5	1,2	0,6°
Westgrönland	0,3	1,7	1,6	1,8	1,5	1,2	0,6°

2. Parry-Inseln und Nachbarschaft im arktischen Archipel Amerikas.

Obwohl südlicher als Grönland gelegen, zeichnet sich dieser Inselkomplex durch seine gröfsere Winterkälte und geringere

Sommerwärme aus. Betrachten wir die Temperaturverhältnisse von Port Kennedy, der in dem Mittelpunkt dieser Inselwelt gelegen ist. Das Jahresmittel beträgt daselbst $-16,8^{\circ}$, ist also $2,2^{\circ}$ geringer als zu Port Foulke, der um 8° dem Nordpole näher liegt. Die mittlere Wintertemperatur beträgt $-37,4^{\circ}$, die Frühlingstemperatur -19° , die Sommertemperatur nur $3,2^{\circ}$ und die Herbsttemperatur $-14,0^{\circ}$. Welches ist die Ursache dieses von seiner Umgebung so verschiedenen Klimas? Das Gebiet ist nirgends durch einen Gebirgswall vor den das ganze Jahr vorherrschenden Nordwestwinden geschützt. Im Winter werden die Luftmassen über Grönland und den Inseln westlich der Davisstraße von der Cyclone im Südwesten Islands aspiriert; im Sommer werden die vorwaltenden nördlichen Winde durch die Depression im Innern Nordamerikas und die Cyclone bei Island bewirkt; wenn auch hier der Luftdruck im Sommer viel höher ist als im Winter, so ist eine gleiche Zunahme auch in der arktischen Zone Amerikas von Februar bis Mai bemerkbar. Wenn auch im Sommer Süd- und Südwestwinde wehen, so können diese zu Gunsten dieses Inselkomplexes keine namhaften Temperaturerhöhungen hervorrufen, da sie im Verhältnis zu den Nord- und Nordwestwinden (64%) in der Minderheit sind, was leicht erklärlich ist, wenn man die Konfiguration des nordwestlichen Amerika in Betracht zieht. Dieser Teil ist von Gebirgen von nicht unbedeutenden Höhen durchzogen, die also den warmen Seewinden den Zugang verwehren. Ein anderer wichtiger Faktor, der zu Ungunsten dieses Inselkomplexes mitspricht, sind die zahlreichen Inseln selbst, die, wie von Dove nachgewiesen ist, im Winter die Eisbildung äußerst fördern. Sowohl für die direkte Bildung des Eises, als auch für die Anhäufung zusammengeschobener Eismassen sind hier die günstigsten Bedingungen vorhanden, wo durch viele zusammengedrängte Inseln für die Eisbildung eine ausgedehnte Küstenentwicklung gegeben ist, welcher die starke Brandung fehlt, die in offenen, tiefen Meeresbecken immer wieder das Eis bricht, und wo außerdem die trennenden Meeresteile nicht breit und tief genug sind, um den ins Treiben geratenen Massen einen ungehinderten Abzug zu gestatten. Das die Nordküsten Amerikas bespülende Polarmeer hängt vermittelst mehrerer im allgemeinen von Ost nach West gerichteten Straßen mit der Baffinsbay zusammen. Wenn nun bei zunehmender Mittagshöhe der Sonne sich das Eis des Polar-meerès in Bewegung setzt, so werden im Durchzug durch diese nach der Baffinsbay führenden Straßen die Eismassen sich stets von neuem aufstauen. Hierin liegt der Grund, daß auch im Sommer hier ein Kältemaximum zu treffen ist. Alle

von der Insolation herrührende Wärme wird zur Tauung der Eismassen verbraucht, die Wärmezufuhr durch Meerwasser ist in den seichten Becken sehr gering, und die Luftwärme kann sich daher wenig über den Frostpunkt erheben. Sämtliche Stationen, mit Ausnahme von Felixhafen, erreichen im Sommer die Mitteltemperatur von $2,5^{\circ}$ nicht. Im Felixhafen, $69^{\circ} 59' N.$, $92^{\circ} 1' W.$, dürfte die hohe Sommertemperatur ($4,9^{\circ}$) auf ungenügendem Schutze gegen Strahlung beruhen, da in dem benachbarten Victoriahafen die mittlere Sommertemperatur nur $1,8^{\circ}$ erreicht und letztere mit den Beobachtungen der andern Stationen übereinstimmt. Auf diese Weise läßt sich auch das Maximum von $21,1^{\circ}$ im Felixhafen erklären. Im Winter stellt der Inselkomplex durch das Gefrieren der Meeresarme einen Kontinent dar, dessen Temperatur im Januar bis auf -35° sinkt.

Die Monatsschwankungen der Temperatur sind im Sommer auffallend gering und auch im Winter nicht viel größer als in Mitteleuropa; im Herbst und Frühling erreichen sie ihr Maximum.

Sie betragen nach 8½jährigen Beobachtungen (im Northumberland - Sund, Wellingtonkanal, Griffith-Insel, Port Kennedy, Felixhafen, Victoriahafen, Mundyhafen, Hudsonstraße) im Januar 25° , Februar $22,2^{\circ}$, März $25,8^{\circ}$, April $28,6^{\circ}$, Mai $26,3^{\circ}$, Juni $18,2^{\circ}$, Juli $14,2^{\circ}$, August $11,4^{\circ}$, September $16,6^{\circ}$, Oktober $22,9^{\circ}$, November $27,9^{\circ}$, Dezember $21,4^{\circ}$.

Die Beobachtungen auf Melville-Insel, die dort seit einer langen Reihe von Jahren angestellt werden, bestätigen diejenigen von Port Kennedy; dort beträgt die mittlere Jahrestemperatur $-17,0^{\circ}$, die Julitemperatur $5,8^{\circ}$.

3. Britisch-Nordamerika.

Wenn man die immense Ausdehnung dieses Gebietes ins Auge faßt, so herrscht östlich von den Rocky Mts. eine wunderbare Gleichmäßigkeit des Klimas vor. Den Grund hiervon müssen wir einestheils in der gleichmäßigen Höhe fast des ganzen Gebietes östlich der Rocky Mts. bis zur Hudsonsbay, welche die durchschnittliche Höhe des Mississippithales wenig überschreitet, und andernteils in dem Fehlen eines von West nach Ost gerichteten Gebirgszuges suchen. Natürlich ist die Temperatur der südlichen Distrikte höher als die der nördlichen, doch ist oft durch Britisch-Nordamerika die Kälte so verbreitet, daß im Winter der Boden während 2, 3 und bisweilen 4 Monaten mit einigen Fuß Schnee bedeckt ist. Aber wegen der Reinheit der Luft und der Abwesenheit von Nebeln ist es leicht, sich gegen die Kälte zu schützen, während der Schnee als ein Segen betrachtet wird, der die Erde

feucht und warm hält. Obgleich der Winter länger dauert als in Europa, so geht er schnell in den Sommer über, wo die Hitze beträchtlich wird und alle Getreidearten zur Reife kommen. Die alten Einwohner sagen, daß ihr Klima, soweit sie sich erinnern können, merklich milder geworden sei. Nicht mit Unrecht ließe sich behaupten, daß in demselben Verhältnisse, als die dortigen Wälder ausgerodet und dadurch immer größere Landstrecken der Einwirkung der Sonne ausgesetzt werden, die dann ihrerseits auch ihren Einfluß auf die Atmosphäre üben können, auch das Klima immer milder werden würde. Die Jahrestemperatur dieses Gebietes schwankt zwischen -10° und $6,8^{\circ}$, wenn man Fort Good Hope als nördlichste und Toronto als südlichste Station annimmt. Beide Orte haben einen Breitenunterschied von $23^{\circ} 55'$. Um ein Bild von den klimatischen Verhältnissen zu erhalten, müssen die Winter- und Sommertemperaturen einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Wie oben schon erwähnt, ist diesem Länderkomplex ein kontinentales Klima eigen, d. h. die Differenz zwischen dem kältesten und wärmsten Monat ist groß. So beträgt die Jahresamplitude zu Fort Hope 46° , Red River Settlement $38,4^{\circ}$, Toronto, welches schon das durch die großen Wassermassen der canadischen Seen gemilderte Klima der Uferregionen repräsentiert, nur $24,4^{\circ}$ C.

Die Jahresamplitude nimmt im Innern sehr langsam von Norden nach Süden ab; sie beträgt zu Fort Franklin $41,2^{\circ}$, Fort Chipewayan $39,6^{\circ}$, Winnipeg $38,3^{\circ}$. Schneller nimmt dieselbe in den östlichen Teilen von Britisch Nordamerika ab (was dem Einflusse des Ozeans zuzuschreiben ist). Hebron in Labrador, das in gleicher Breite mit Fort Chipewayan gelegen ist, hat eine Amplitude von $29,3^{\circ}$. Der Einfluß des Ozeans macht sich hier geltend, indem das Maximum der Temperatur in den August fällt; während die höchste Temperatur im Innern im Juli und sogar schon im Juni beobachtet wird. In dem Teile von Britisch Nordamerika, welcher östlich von einer Linie begrenzt wird, die die Mündung des Mackenzie mit Fort William am Lake Superior verbindet, schwankt die Sommerwärme zwischen 10 und 18° und die Winterkälte zwischen -31 und -20° . Der nördliche und östliche Teil von Britisch Nordamerika steht ganz unter dem Einflusse des sich nördlich ausbreitenden Inselkomplexes und des seine Küste bespülenden Polarmeeres, die diesen Teilen kalte Winter und kühle Sommer verursachen. Sehr ungünstige Temperaturverhältnisse haben die Hudsonsbay-Länder, wie uns Fort Churchill zeigt. Dort beträgt die Jahrestemperatur $-6,8^{\circ}$, die Wintertemperatur $-30,4^{\circ}$, die Sommertemperatur $11,4^{\circ}$ und die Herbsttemperatur $-3,8^{\circ}$. Diese un-

günstigen Verhältnisse müssen dem Einflusse der Hudsonsbay zugeschrieben werden, die das kalte Wasser des Polarmeeres aufnimmt und durch ihre Konfiguration keinen Abfluß für dieselben hat. Der geringste Wind von der Hudsonsbay bringt sofort Kälte, so warm es auch vorher gewesen sein mag. Besonders verzögert sich die Wärme im Frühling, wo selbst im Mai Fluß und Berg noch fast ebenso aussehen, wie mitten im Winter; aber der Übergang ist dann rasch. Nach Dr. Raes' Mitteilungen ist der Boden bei York Factory bis zu einer Tiefe von 4—5 m gefroren und taut im Sommer wenig über 1 m auf.

Je weiter wir uns in das Innere begeben, desto weniger macht sich der Einfluß des Ozeans bemerkbar, indem wir dort kontinentaleres Klima antreffen, welches uns Red River Settlement zeigt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt daselbst $1,2^{\circ}$, die Wintertemperatur $-18,3^{\circ}$, die Sommertemperatur $18,3^{\circ}$, die Differenz zwischen dem kältesten und wärmsten Monat $38,4^{\circ}$.

Die hohe Sommertemperatur bewirkt, daß die Melone im Freien wächst und zur vollständigen Reife im August und September gelangt. Letztere Thatsache ist aber auch ein Beweis, daß Sommerfröste fehlen. Der Winter bietet dagegen mit einer lang andauernden Kälte und seiner klaren, trockenen Atmosphäre ein um so trostloseres Bild dar. Das Quecksilber gefriert oft und bleibt fest für viele Tage.

Der Seeendistrikt zwischen Lake Superior und Lake Winnipeg wird von November bis Mai von Eis und Schnee eingehüllt. Im Frühling wirken die Seen, Moräste und die Schneeschmelze abkühlend, und es nimmt daher die Temperatur sehr langsam zu, im Sommer wirken die Seen ebenfalls Temperatur erniedrigend, der Herbst aber wird durch sie auf Kosten des Winters verlängert.

In Manitoba ist infolge des Fehlens der Seen und Moräste die Sommertemperatur höher; die dortigen Weizenernnten stehen denjenigen der besten Unionsstaaten nicht nach.

Im Winter wird in den benachbarten Regionen der Rocky Mts. die Temperatur durch den Südwest gemäßig. Er kommt vom Stillen Ozean durch die Depressionen der Gebirge und erhöht die Temperatur bis zum Thale des Peace River und selbst gelegentlich bei Fort Good Hope. Nach Dawson ist er als ein echter Föhnwind anzusehen.

Betrachten wir jetzt näher die Temperaturverhältnisse von Labrador, Neufundland und Canada.

Die Halbinsel Labrador bildet ein Hochland von etwa 600 m Erhebung. Sie liegt unter derselben Breite, wie die Britischen Inseln, Preußen und das südliche Schweden, und doch gleicht

das Klima mehr den Ländern Europas, welche unter 60—70° N.Br. liegen. Zu Hebron sind die Temperaturverhältnisse folgende: Jahrestemperatur —4,4°, Wintertemperatur —18°, Sommertemperatur 7,5°, Frühlingstemperatur —5,8° und Herbsttemperatur —1,3°; der kälteste Monat ist der Januar mit —20,5° und der wärmste der August mit 8,8°. Diese Zahlen zeigen, daß die Temperaturverhältnisse für den Pflanzenwuchs sehr ungünstig sind, indem die Wärmemenge nicht hinreicht, um eine nennenswerte Vegetation hervorzubringen, da dieselbe im Frühjahr zu Grunde geht. Nur die Monate Mai bis September weisen eine Temperatur auf, die über dem Gefrierpunkte liegt.

In dem jährlichen Wärmegange der Stationen von Labrador ist bemerkenswert, daß der September wärmer ist als der Juni, und daß der Oktober ziemlich dieselbe Temperatur hat, wie der Mai. Zu Hoffenthal, 55° 35', beträgt nach 6jährigen Beobachtungen die mittlere Temperatur des September 6,5°, die des Juni 6,1°, diejenige des Oktober 1° und die des Mai 0,9°. Die Nordspitze von Labrador ist im Sommer auf beiden Seiten durch die eisigen Gewässer des Polar-meeres erkältenden Einflüssen ausgesetzt, welche veranlassen, daß hier die Baumgrenze in einem von NW nach SE gerichteten Bogen das Gebiet umsäumt, in welchem nur wenige Gewächse ein kümmerlich Dasein fristen.

Eines milderen Klimas erfreut sich Neufundland. St. Johns hat eine jährliche Mitteltemperatur von 3,4°, eine mittlere Wintertemperatur von —4,9° und eine Sommertemperatur von 12,2° C. Die Ursache dieser größern Wärmemenge ist der Golfstrom, der aber die Insel nicht direkt berührt. Neufundland erfreut sich in seinem Innern eines klaren blauen Himmels, seine südliche und südwestliche Küste dagegen ist wegen der hier im Sommer herrschenden kalten Nebel berüchtigt. Diese werden durch den Golfstrom verursacht, der im Sommer sich weiter nach Norden erstreckt als im Winter, wo ihn der Polarstrom mehr nach Süden verdrängt. Der Nebel erstreckt sich selten weit in das Innere hinein, die Küsten verzehren ihn, wie die Einwohner sagen. Das Thermometer sinkt höchstens ein- oder zweimal unter —17° und dann nur auf wenige Stunden und um wenige Grade, während in Canada und Neubraunschweig eine Kälte von —23° bis —30° tage- und bisweilen wochenlang anhält, die dort durch die nordwestlichen Winde aus Canada herbeigeführt wird. Im allgemeinen unterscheiden sich die Wärmeverhältnisse Neubraunschweigs wenig von denen Neufundlands.

Canada besitzt durchschnittlich eine mittlere Jahrestem-

peratur von 6° . Sie beträgt zu Quebec $4,6^{\circ}$, zu Toronto $6,8^{\circ}$, zu Montreal 7° , zu Kingston $7,2^{\circ}$. Das Charakteristische sind die äufserst kalten Winter und heifsen Sommer. Der Winter in Quebec, $-10,7^{\circ}$ und in Montreal $-8,4^{\circ}$, ist kälter als der in Petersburg ($-7,5$). Kingston hat mit dem über 15 Grad nördlicher liegenden Petersburg fast gleiche Winterkälte.

Nach Smallwod beginnt der Winter bei Montreal gewöhnlich in der letzten Woche des November oder in der ersten Dezemberwoche und wird durch ein Schneegestöber aus NE eingeleitet, aus welcher Richtung die Winterstürme kommen. Das Eis bricht auf dem Lorenzostrom bei Montreal durchschnittlich am 1. April auf. Im Gegensatze zu den kalten Wintern stehen die heifsen Sommer, die durchschnittlich eine Temperatur von 20° haben, die oft selbst während der Nacht nicht herabsinkt, so daß sich hier z. B. das nächtliche Insektenleben viel interessanter und mannigfaltiger gestaltet als bei uns in Deutschland.

Die südlichen Teile Canadas fangen mit dem 42. und 43. Breitengrade an, liegen also unter dem gleichen Himmelsstriche wie Oberitalien und Südfrankreich. In der Nähe der Seen Erie und Ontario reifen die Trauben im Freien vortrefflich und am Montreal gibt es zahlreiche Obstgärten mit den besten Äpfel- und Birnsorten, da ja die Sommertemperatur von Montreal diejenige von Mittelitalien fast erreicht (Montreal $21,5^{\circ}$, Rom $23,6^{\circ}$). Sehr rasch entwickelt sich infolge der hohen Temperatur die Vegetation. Selbst am nördlichen Ottawa wird die Sonne Ende März und Anfang April schon einige Stunden des Tages brennend heifs und setzt den Saft des Ahornbaumes in Bewegung. Weizen und Mais wird noch in der Nähe von Quebec mit Erfolg angebaut. Der Einfluß der großen Seen ist auf die Temperaturverhältnisse Canadas gering, dagegen macht er sich auf die östlich von ihnen gelegenen Uferregionen bemerklich, wovon später die Rede sein wird.

Im Gegensatze zu dem scharf ausgeprägten Charakter des kontinentalen exzessiven Klimas östlich von dem Felsengebirge herrscht längs der Stellen des Ozeans ein ebenso unterschiedenes Seeklima vor. Das Klima der Westseite von Britisch Nordamerika ist nirgends auf demselben Breitengrade so streng wie an der Ostküste. Die mittlere Jahrestemperatur von Vancouver Island, $9,9^{\circ}$, ist fast dieselbe als die von New York, welches ungefähr 8° südlicher liegt. Das Maximum der Seetemperatur beträgt im Sommer $16,6^{\circ}$ und das der Luft $22,2^{\circ}$, das Minimum der See 5° , das der Luft $-4,7^{\circ}$. Die Temperatur der die Insel umgebenden See ist naturgemäfs

gleichförmiger als die der Luft, und die Amplitude beträgt $17,2^{\circ}$, während die der Luft $26,9^{\circ}$ beträgt. Die See vermindert die Differenz zwischen Sommerhitze und Winterkälte, sie kühlt die Luft im Sommer ab und teilt ihre Wärme, die sie dem Kuro-Shiwo verdankt, im Winter der Insel mit; in einem Worte, sie macht die Insel wärmer und weniger veränderlich als sie sonst sein würde. Nicht allein die See ist es, welche einen so günstigen Einfluß auf die Temperaturverhältnisse ausübt, sondern auch die Konfiguration des Bodens spielt eine nicht unbedeutende Rolle. Die ganze Küste ist von einer hohen Gebirgskette umgeben, die die Winterkälte des Nordens abhält und eine Scheide der klimatischen Verhältnisse bildet, wie sie vielleicht auf der Erde nicht mehr existiert.

Der allgemeine Charakter von Vancouver Island und British Columbia ist ein trockener warmer Sommer, ein klarer schöner Herbst, ein gelinder und nasser Winter und ein sehr angenehmer Frühling.

Das ehemalige russische Nordamerika nimmt ebenfalls teil an der Temperaturvergünstigung, durch die sich die Westküste so vorteilhaft auszeichnet. Obwohl selbstverständlich, je mehr man nach Norden vorschreitet, das Klima rauher wird, so schreitet die Temperaturabnahme dennoch nicht in demselben Verhältnisse, wie an den östlichen Gestaden des Kontinents, fort. Während die canadischen Häfen selbst in niedrigerer Breite durch Eis geschlossen sind, so sind die Häfen selbst nördlich von Sitka frei von Eis, wenigstens von solchem Eise, das der Schifffahrt hinderlich ist. An der Ostküste hört die Baumgrenze am $60.$ Breitengrade auf, während sie an der Westküste bis $66^{\circ} 45'$ hinaufgeht. Die ganze Küste von Sitka bis zur Halbinsel Alaska hat dasselbe Klima. Die Jahrestemperatur von Sitka beträgt $6,5^{\circ}$, die Wintertemperatur $0,3^{\circ}$, die Sommertemperatur $12,5^{\circ}$. Der Winter von Sitka ist daher milder als der von vielen europäischen Hauptstädten, wie Petersburg, Moskau, Stockholm, Kopenhagen, Berlin und Bern, ja sogar milder als der von Mannheim, Stuttgart, Wien. 1831 fror es in Sitka nur 2 Tage im Dezember und 7 Tage im Januar. 1832 fiel das Thermometer nicht unter $-6,0^{\circ}$.

Die thermische und barische Windrose zu Sitka zeigt ein eigentümliches Gepräge. NE und E bringen gerade die entgegengesetzten Temperaturverhältnisse mit sich. Der NE erniedrigt die Mitteltemperatur um 6° , während der E dieselbe um $1,8^{\circ}$ erhebt. Der E ist der ursprüngliche SW, der aber durch den hart an die Küste herantretenden Gebirgszug zu SE und dann zu E abgelenkt wird.

Am Stakeen River, wo der Einfluß der warmen paci-

fischen Strömung ausgeschlossen ist, sind die Jahreszeiten streng markiert, die Winter sind kalt und die Sommer heifs. Der Fluß schliesst sich im Dezember und geht im Mai wieder auf.

Von Sitka nordwärts bis zu den Aläuten nimmt die Temperatur sehr langsam ab. St. Paul, Kadiak Island, hat eine nur um 1° geringere Mitteltemperatur ($5,3^{\circ}$) als Sitka, die Sommertemperatur ist in beiden fast gleich.

Die Aläuten sind kälter als St. Paul, da ihre Temperaturverhältnisse eher an denen der Beringsee als an denjenigen des Stillen Ozeans teilnehmen; doch ist die Differenz nicht groß. Die Sommertemperatur steigt infolge der vorherrschenden Bewölkung selten über 20° , noch seltener fällt die Wintertemperatur auf -20° . Die mittlere Jahrestemperatur von Iliuluk, Unalashka ist $3,5^{\circ}$.

Sobald wir die Halbinsel Alaska und die Ausläufer der Alaska-Berge überschritten haben, begegnen wir ganz andern Temperaturverhältnissen. Die Ursache ist darin zu suchen, daß wir nun in das Bereich des von der Beringstraße kommenden Polarstromes gelangt sind und der Einfluß des Kuro-Shiwo, der durch die Aläuten und die Halbinsel Alaska eine östliche Ablenkung erfährt, aufgehört hat. Es ist bemerkenswert, mit welcher Schnelligkeit die Temperatur von Süden nach Norden abnimmt. Die mittlere Jahrestemperatur zu Sitka beträgt $6,3^{\circ}$, die von Ikogmut nur $-4,1^{\circ}$, also eine Differenz von $10,4^{\circ}$ auf $4\frac{3}{4}$ Breitengrade. Auffällig ist ferner, daß von Ikogmut an die Jahrestemperatur wieder weniger rasch abnimmt, da zwischen hier und Point Barrow, die $9\frac{1}{2}$ Breitengrade entfernt sind, die Differenz nur $10,2^{\circ}$ beträgt. Der Sprung in der Temperaturverteilung erscheint so gewaltig, daß, wie Herr von Baer bemerkt, auf der Südseite der schmalen Landzunge von Alaska Kolibris, die gefiederten Boten des Südens, weiter nördlich hinaufgehen als auf der Nordseite Walrosse, die unförmlichen Bewohner des Nordens, herabkommen.

Besonders rasch zeigt sich die Abnahme der mittlern Wintertemperatur; so besteht zwischen Ikogmut und Point Barrow eine Differenz von $10,6^{\circ}$. Zu Fort Michael am Norton Sound und dem Kwichpak River beginnt der Winter Ende September, wo der erste Schnee fällt. Der Frühling beginnt in den ersten Tagen des Mai, doch hört der Eisgang erst mit dem 20. Mai auf. Die Sommertemperatur ist viel höher im Innern des Landes, als an der Küste, wo die Monate Mai, Juni und ein Teil des Juli hell und warm sind. Das Thermometer in Fort Youkon fällt bisweilen im Winter auf -50° und es steigt im Sommer bis auf 26° . Die Winterkälte

wird durch die vom Inselarchipel herwehenden Nordostwinde herbeigeführt.

Innerhalb der Beringsee sind die Wärmeschwankungen gering. St. Paul Island zeigt eine relativ hohe mittlere Jahrestemperatur von $2,1^{\circ}$. Charakteristisch ist die kleine Differenz zwischen Winter- und Frühlingstemperatur von nur $0,5^{\circ}$.

Das Klima der Inseln westlich von 155° W. L. gleicht sehr demjenigen Schottlands, wo der Winter grösstenteils mild und gemässigt, die Sommer häufig regnerisch sind.

4. Temperaturverhältnisse der Vereinigten Staaten

a) östlich der Rocky Mountains und des 100° W. L. v. Gr., oder im atlantischen Gebiete.

Für den Gang der Temperatur in dem östlichen Teile der Vereinigten Staaten sind von Bedeutung der Ozean im Osten und Süden mit seinen zwei die Ostküste berührenden, einander entgegengesetzten Strömungen, und die grossen canadischen Seen, die einen merklichen Einfluß auf ihre Nachbarschaft ausüben. In den Wintermonaten bewirkt die Nähe des Golfstroms an der atlantischen Küste eine Temperaturerhöhung des benachbarten Landes; in den Sommermonaten macht sich umgekehrt die kalte Küstenströmung fühlbar, wie die Isotheren durch ihre Krümmung nach Süden zeigen. Die Depression wäre noch grösser, wenn nicht die herrschenden westlichen Winde die warme Luft des Innern seewärts führen würden. Auf das Jahresmittel der Temperatur hat deshalb die Nachbarschaft des Ozeans keinen grossen Einfluß auf die Ostküste. Ähnlich verhält es sich mit dem Einflusse der grossen Seen; im Winter erwärmen sie die Luft, kühlen sie dagegen im Sommer ab, wodurch die Jahrestemperatur nicht merklich verändert wird. Die nördlichste Station des östlich von 100° W. L. v. Gr. gelegenen Teiles der Vereinigten Staaten ist Fort Kent und die südlichste Station ist Key West in der Florida-Straße. Die Breitendifferenz zwischen beiden Stationen beträgt $22^{\circ} 42'$. Die mittlere Jahrestemperatur zu Fort Kent ist $2,6^{\circ}$. Rechnet man noch $0,87^{\circ}$ hinzu, welcher Wert ungefähr der Temperaturabnahme für 175 m entspricht, so würde die mittlere Jahrestemperatur in Fort Kent, wenn es an dem Meeresniveau gelegen wäre, $3,4^{\circ}$ betragen. Key West besitzt eine Mitteltemperatur von 25° ; wir erhalten also eine Differenz in der mittlern Jahrestemperatur von $21,6^{\circ}$, d. h. die Wärmeabnahme für einen Breitengrad beträgt ungefähr 1° . Anders gestaltet sich das Verhältnis, betrachtet man die Wärmeabnahme im Sommer und Winter. Im erstern Falle sinkt sie auf $0,5^{\circ}$ herab und im letztern steigt sie auf $1,4^{\circ}$. Diese Daten erklären sich durch die verschiedene Lage beider Ört-

lichkeiten. Key West steht direkt unter dem Einflusse des Golfstromes, der ihm ein gleichmäßiges Klima verschafft, während Fort Kent, ungefähr 75 geogr. Meilen vom Ozean entfernt, sehr stark durch das westlich gelegene Canada beeinflusst wird, woher im Winter Nordwestwinde sehr hohe Kälte und im Sommer hohe Wärme bringen.

Der östliche Teil der Vereinigten Staaten zerfällt nach seiner mittlern Jahrestemperatur in 4 fast gleiche Teile, nämlich:

- 1) mit einer Mitteltemperatur von 4—10°,
- 2) „ „ „ „ 10—15°,
- 3) „ „ „ „ 15—20°,
- 4) „ „ „ „ über 20°.

Dem ersten Teile gehören sämtliche östlich und südlich von den großen Seen gelegene Staaten an, eine starke Kurve nach Süden bildet die Isotherme 10° auf 40° N. Br. und 80° W. L. Durch dieselbe werden Teile von Pennsylvanien und Virginia eingeschlossen, insoweit sie von den Alleghany Mts. durchzogen sind. In der Ebene geht die Isotherme 10° auf dem 41. Parallel. Der zweite Abschnitt umfaßt die Staaten, die östlich vom 100. Meridian und zwischen den Breitenkreisen 41 und 36 liegen, mit Ausschluss des von den Alleghany Mts. durchzogenen Gebietes; der dritte Teil schließt die Staaten zwischen dem 36. und 31. Parallel ein, und dem vierten gehören die südlich vom 31. Parallel gelegenen Distrikte an.

Der erste Teil mit einer Mitteltemperatur von 4—10° umfaßt sämtliche östlich und nordöstlich von den großen canadischen Seen gelegenen Staaten, sowie das von ihnen umschlossene Michigan und die Staaten Wisconsin, Minnesota, Iowa und Dakota. Der östlich von den großen Seen gelegene Teil scheidet sich auch in anderer Beziehung von den südlicher gelegenen Staaten ab, indem der 41. Parallel die Grenze bildet, jenseits welcher sich die mittlere Wintertemperatur über 0° erhebt. Dieser nördlich vom 41. Parallel gelegene Teil zeichnet sich durch sein exzessives Klima aus. So beträgt in Fort Kent, Maine, die mittlere Wintertemperatur —11,7°, die Sommertemperatur 16,4°, Differenz 28,1°. Nicht anders gestalten sich die Verhältnisse südlicher gelegener Stationen. Albany, 42° 39' N. Br., hat eine mittlere Wintertemperatur von —3,4° und eine mittlere Sommertemperatur von 21,2°, mithin erreicht die Differenz ebenfalls eine Höhe von 24,6°. An unmittelbar an der See gelegenen Stationen schwächen sich diese Gegensätze ab, jedoch nicht in dem Maße, als man erwarten sollte. In New Providence z. B. beträgt bei einer mittlern Wintertemperatur von —2,5° und dem Temperaturmittel von 19,9° für den Sommer, die Differenz noch 22,4°. Der in der Nähe fließende Golfstrom vermag den Winter

dieses Küstengebietes nicht zu mildern, weil er sich nicht allein von der Küste wegwendet und von ihr durch den nach Süden gehenden Labradorstrom getrennt wird, sondern auch weil die vorherrschende nordwestliche Windrichtung es verhindert. So zeigt denn auch das unter $42^{\circ} 41'$ gelegene Boston, welches nur 320 Seemeilen von der 25° warmen Zunge des Golfstroms entfernt ist, im Januar eine Temperatur von nur $-3,2^{\circ}$ C.

Begeben wir uns in das Innere des Landes nach der im Staate Jowa unter $41^{\circ} 36'$ N. Br. und $93^{\circ} 38'$ W. L. gelegenen Des Moines City, so tritt uns ebenfalls eine hohe Differenz zwischen Winter- und Sommertemperatur entgegen. Sie beträgt bei einer Wintertemperatur von $-3,6^{\circ}$ und bei einer Sommertemperatur von $22,1^{\circ}$ $25,7^{\circ}$. Dafs hier dieselbe der kontinentalen Lage dieses Ortes angemessen ist und nicht überraschen darf, leuchtet ein. Plötzliche starke Schwankungen der Temperatur sind hier nicht selten, die dann von Hagelstürmen begleitet sind.

In der Mitte unsers Gebietes befinden sich die grofsen canadischen Seen, die im Winter erwärmend, im Sommer aber abkühlend auf ihre Umgebung wirken.

Nach A. Winchells Mitteilungen in den Proceedings of the American Association zeigen die Isotheren eine steile Biegung nach Süden, sobald sie sich dem Seeendistrikte genähert haben. So geht die Isothere 20° an dem Westufer des Michigan-Sees von 45° N. Br. auf 43° N. Br. herab; die Biegung der Isochimenen ist gerade die entgegengesetzte von jener im Sommer, sie rücken im Bereiche der Seenregion weiter nach Norden vor, wie uns der Verlauf der Isochimene von -5° zeigt. Da im Winter die Winde aus westlicher Richtung vorherrschen und niedere Temperaturgrade aus dem Innern mitbringen, so müssen sie sich bei ihrem Hinwegstreichen über die Seen wesentlich erwärmen und deshalb mit einer höhern Temperatur an dem Ostufer ankommen. Die Januartemperatur von Chicago ist -5° , diejenige von New Buffalo an dem gegenüber liegenden Ostufer des Michigan-Sees -1° , die von Milwaukee $-6,4^{\circ}$ und diejenige des gegenüber liegenden Grand Haven $-3,9^{\circ}$. Im Frühlinge wirken die aus östlicher Richtung über den Michigan-See streichenden Winde abkühlend auf das Westufer ein. Während des Herbstes wiegen die W-Winde wieder vor, welche den Beginn der kalten Jahreszeit an dem Ostufer 3 Wochen weiter hinausschieben, nachdem schon schwere Nachtfroste auf der Westseite stattgefunden haben.

Eine auffallende Erscheinung in Dakota und den Nachbargebieten ist die, dafs der März eine bedeutend geringere Mitteltemperatur als der November hat. Wir sollten hier

gerade das Gegenteil vermuten, da im Frühlinge bei der großen Entfernung des Ozeans eine rasche Wärmezunahme zu erwarten ist. So steht in Fort Buford in Dakota der Märztemperatur von $-8,1^{\circ}$ die Novembertemperatur von $-1,5^{\circ}$ gegenüber. Der Grund ist darin zu suchen, daß der Boden, den im Winter nur wenig Schnee bedeckt, und der so dem Eindringen der Kälte preisgegeben ist, im Frühlinge einen erkältenden Einfluß auf die Luft ausübt. (Zeitschr. für Meteorologie 1873.)

In der ersten bis 41° reichenden Zone sinkt im Winter die Temperatur unter den Gefrierpunkt des Quecksilbers in folgenden Staaten:

Michigan in	Fort Brady	$-43,9^{\circ}$
Minnesota „	Fort Ripley	$-42,2^{\circ}$
Dakota „	Pembina	-50° (Dez. 1879)
New York „	Gouverneur	-40°
	„ Lowville	-40°
Madison Barracks		$-42,2^{\circ}$
Sacketts Harbor		$-43,3^{\circ}$
Salem		-40° .

Sogar im Sommer sank das Thermometer unter 0° in den Staaten Maine, Michigan, Minnesota, New York. Unter den der ersten Zone angehörenden Staaten haben die größte Differenz zwischen absolutem Maximum und Minimum folgende:

Jowa 78° , Wisconsin 78° , New York 79° , Minnesota 82° .

Die zweite Zone, mit einer mittlern Jahrestemperatur von $10-15^{\circ}$, umfaßt die Staaten New Jersey, Maryland, Virginia, Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois, Missouri und den östlichen Teil von Kansas. Längs der atlantischen Küste finden wir die Mitteltemperatur der zweiten Zone sehr stark ausgeprägt. Sie beträgt zu Philadelphia $11,2^{\circ}$, Baltimore $11,9^{\circ}$ und Norfolk 15° . Auffallend ist der parallele Verlauf der Isothermen mit den Parallelkreisen, sowohl auf der West- als auch auf der Ostseite der Alleghany Mts., ein Beweis, daß diese nicht imstande sind, eine Temperaturveränderung an ihrer Ost- und Westseite hervorzubringen. Je weiter wir an der atlantischen Küste von Nord nach Süd gehen, desto kleiner wird die Differenz zwischen Winter- und Sommertemperatur. Sie beträgt zu Baltimore, $39^{\circ} 77' N. Br.$, noch $22,1^{\circ}$, während sie zu Norfolk, $36^{\circ} 51' N. Br.$, auf $19,4^{\circ}$ gesunken ist.

Obwohl die Alleghany Mts. auf den periodischen Gang der Temperatur keinen Einfluss ausüben, so ist doch ein solcher nicht zu verkennen, faßt man die unperiodischen Schwankungen ins Auge. Auf der Ostseite derselben finden wir im Winter keinen so plötzlichen Temperaturwechsel als im mittlern Mississippigebiet, z. B. in St. Louis, wo derselbe durch eisige Nordwinde herbeigeführt wird. Wenn auch die Alle-

ghany Mts. keine bedeutende Höhe erreichen, so sind sie doch imstande, die extrem-kalten Winde des Nordens von den atlantischen Küsten fernzuhalten. Einen Beweis liefern die in der Tabelle angeführten Minimaltemperaturen.

St. Louis liegt im Mittelpunkte des Mississippithales und des atlantischen Theiles der Vereinigten Staaten überhaupt; es ist daher vorzüglich geeignet, als Typus der ganzen mittlern Region der nordamerikanischen Freistaaten hingestellt zu werden. Die Wärmeschwankungen von St. Louis sind die eines Kontinentalklimas. Die Differenz zwischen dem wärmsten und kältesten Monat erreicht $26,1^{\circ}$, zwischen der Morgentemperatur des Januar und der Nachmittagswärme des Juli $36,0^{\circ}$. Das absolute Maximum erreichte im August 1834 $42,2^{\circ}$, das Minimum im Februar 1835 $-31,7^{\circ}$, die absolute Amplitude beträgt somit $73,9^{\circ}$. Überaus rasch folgen sich große Wärmeschwankungen während des Winters, durchschnittlich 32° im Monat erreichend. Nirgends unter derselben Breite finden sich so große und plötzliche Schwankungen der Temperatur und des Luftdruckes, wie im Mississippithale und in Texas. Im Januar 1864 stieg nach dem Minimum von $-30,3^{\circ}$ die Temperatur wieder bis auf $22,2^{\circ}$, so daß in diesem einem Monate die Temperaturschwankung die Höhe von $52,5^{\circ}$ erreichte. Diese und noch andre ähnliche Schwankungen geben eine Vorstellung von der ungemein großen Veränderlichkeit der Temperatur im Mississippithale, welche durch den raschen Wechsel der warmen Golfwinde mit den eisigen Nordwinden, die von den Hudsonsbay-Ländern über die ungeheuer schutzlosen Flächen herabbrausen, verursacht wird. Frost kann im Ohiothale in jedem Monat eintreten; so bildete sich am 2. Juni 1843 Eis von 25^{mm} Dicke. Fröste traten ein im Juni 1846, Juli 1835, August 1832, 35, 59. (Zeitschrift für Meteorologie, 1873.)

Das südliche Illinois ist einigermaßen durch das von Ost nach West ziehende Ozarkgebirge vor den empfindlichen Nordweststürmen geschützt. Der Sommer, vorzüglich der Juli, ist fast jedes Jahr sehr heiß, der Winter abwechselnd gelinde und sehr streng. Der Mississippi friert bisweilen südlich bis über St. Genieve, 38° N. Br., hinaus fest zu und ist bei St. Louis mit schweren Fuhrwerken zu passieren; diese Extreme sind in der Breite von Messina auf Sicilien bemerkenswert. Besonders stark ist der Temperaturübergang vom Winter zum Frühlinge, indem dieselbe von $0,5^{\circ}$ auf $12,7^{\circ}$ steigt, doch sind Schneefälle im April und Nachtfroste im Mai nicht ausgeschlossen.

Die dritte Zone mit der Mitteltemperatur von $15-20^{\circ}$ erstreckt sich von $36-31^{\circ}$ N. Br. und umfaßt die Staaten

Nord- und Südcarolina, Tennessee, Arkansas, Indian Territory und die nördlichen Teile von Alabama, Mississippi, Louisiana und das nordöstliche Texas. Im allgemeinen ist der Charakter dieses Teiles nicht verschieden von dem vorigen. Nur nimmt naturgemäß die Differenz zwischen mittlerer Winter- und Sommertemperatur ab. Im Innern dagegen wird sie nicht in demselben Verhältnis wie an der Küste kleiner. Sie beträgt zu Washington in Arkansas bei einer Wintertemperatur von 7° und einer Sommertemperatur von $25,6^{\circ}$ $18,6^{\circ}$. Auch dieser Teil hat im Norden unter den plötzlich hereinbrechenden Nordstürmen zu leiden infolge des Mangels von Ost nach West gerichteten Gebirgszügen. Nur das Cumberland-Gebirge in Tennessee vermag einigen, wenn auch nicht bedeutenden Schutz vor ihnen zu gewähren. Besonders fühlbar sind die Nordweststürme in Texas, denen dort der Name „Northers“ beigelegt worden ist. Sie drücken oft die Temperatur von 25° auf den Gefrierpunkt herab. Sie beginnen gewöhnlich des Morgens, das Thermometer fällt oft 10° in 20 Minuten. An dem Punkte, wo der Sturm seinen Anfang nimmt, erfolgt ein nur kurze Zeit dauernder Regenguß. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, daß durch den kalten Luftstrom der Taupunkt herbeigeführt wird, wobei dann der condensierte Wasserdampf zu Boden fällt. Die Schnelligkeit des Windes beträgt oft 65 km in der Stunde. Die „Northers“ beginnen im Oktober und hören im April auf. So rasch die Temperatur während der „Northers“ fällt, ebenso rasch steigt sie nach denselben wieder. Woeikoff sieht die Ursache dieser Winde in den bedeutenden Schwankungen des Luftdruckes an der Ostküste des mexikanischen Meerbusens im Winter und am Anfange des Frühlings (Zeitschrift für Meteorologie, 1879, S. 9). Im Sommer sind die Veränderungen des Luftdruckes in Mexiko sehr klein, und dann fehlen die „Northers“ fast gänzlich. Römer berichtet in seinem Buche über Texas folgenden raschen Temperaturwechsel: Am 8 April 1846 gefror während der Nacht das Waschwasser im Zimmer und noch um 8³⁰ a. m. zeigte das Thermometer -5° . Dagegen zeigte am folgenden Tage um 2^h p. m. das Thermometer $27,5^{\circ}$ im Schatten. Ähnliche auffallende Temperaturwechsel wiederholten sich in den folgenden Tagen noch mehrere Male.

Ebenso rasche Temperaturwechsel, wie wir sie eben betrachteten, werden uns nicht von dem östlich der Alleghany Mts. gelegenen Teile berichtet. Der Grund liegt einestheils in der geringeren Entfernung des Ozeans, andernteils in dem Vorhandensein der Alleghany Mts., welche die eisigen Nordstürme abhalten.

Die vierte Zone mit einer Mitteltemperatur von über 20°

umfaßt die südlich des 31. Parallel liegenden Staaten. Der östliche und südliche Teil dieser Zone zeichnet sich durch ein gleichmäßiges Klima aus. Zu Fort Brooke in Florida, mit einer Mitteltemperatur von $22,1^{\circ}$, beträgt die Differenz zwischen Winter- und Sommertemperatur nur noch $10,2^{\circ}$. Der Grund liegt darin, daß hier der Golfstrom sowohl im Süden als auch im Osten seinen wohlthätigen Einfluß geltend macht. Diese Verhältnisse gipfeln auf der kleinen Insel Key West, deren Temperatur schon ganz tropisch ist. Das Jahr hat dort eine Mitteltemperatur von 25° — der Januar von $20,6^{\circ}$, der Juli von $28,7^{\circ}$. Frost ist in Key West noch nie beobachtet worden. Das Minimum innerhalb 26 Jahren beträgt $6,7$ Grad.

Nimmt man die Maximaltemperatur von 43° als eine ausnehmlich hohe Temperatur an, so finden wir dieselbe in dem ganzen östlich von 100° W. L. v. Gr. liegenden Gebieten in folgenden Staaten überschritten:

Indian Territory (Fort Gibson $46,6^{\circ}$),

Texas (Fort Mason $45,5$),

(Fort Belknap $43,3$),

(Fort Graham $44,4^{\circ}$).

Die Lage dieser Stationen zeigt, daß es nur der Westen ist, der so hohe Temperaturen aufweist.

b) Temperaturverhältnisse der Vereinigten Staaten
westlich von 100° W. L. v. Gr.

Die Temperatur auf den Prairien ist im Hochsommer weniger drückend heiß als man erwarten sollte. Die teilweise mit Schnee bedeckten Gebirge senden eine erfrischende Brise herab, die eine schnelle Verdunstung des Schweißes bewirkt und so die Hitze bei weitem nicht so fühlbar, wie eine gleich hohe Temperatur in einer feuchteren Gegend macht.

Wie fast überall in Nordamerika, so ist auch hier auf den Prairien der Herbst die angenehmste und schönste Jahreszeit, die man als den sogenannten Indian summer bezeichnet. Es fällt dann nur sehr selten Regen, die Tage sind warm und sonnig. Zuweilen erstreckt sich der Indian summer bis Mitte Dezember, wo ihm dann ein plötzlich eintretender Schneesturm ein jähes Ende bereitet.

Gebiet der Rocky Mountains.

Ist das östlich von 100° W. L. v. Gr. gelegene Land im großen und ganzen ein Bild gleichartiger Klimazustände, so treten die schärfsten Gegensätze in den Rocky Mountains hervor. Das Klima hängt hier in einem Maße, wie es nur in einem ausgedehnten Hochgebirgsgebiet möglich ist, von den Höhen- und Gestaltungsverhältnissen des Erdbodens und

mehr von diesen als von jenen ab. Der großartigste und wirkungsvollste ist aber der Plateaucharakter des Landes. Auf diesem Plateau sind die Kämme und Gipfel der Felsengebirge, der Sierra Nevada und der kleinern Gebirge von Colorado, Nevada, Neu-Mexiko aufgesetzt. Die meisten Flüsse des Gebiets, mit Ausnahme derer, welche in Steppenseen des Plateaus enden, haben ihr Bett tief in den felsigen Grund eingesägt und bilden sogenannte Cañons. Eine Folge hiervon ist, daß dieselben vor großem Wasserverlust durch Verdunstung geschützt sind, welche sonst in diesen beträchtlichen Höhen eine rasche ist, wie der große Salzsee bezeugt.

Waren wir im östlichen Teile der Vereinigten Staaten imstande, die Isothermen parallel den Parallelkreisen zu verfolgen, so sehen wir hier, daß dieselben eher den Meridianen entlang gehen.

Der allgemeine Temperaturcharakter dieser Plateaus ist gekennzeichnet durch sehr hohe Sommerwärme und durch eine im Verhältnis zur bedeutenden Erhebung des Gebietes höhere Wintertemperatur, als der Osten der Vereinigten Staaten sie aufweist. Beim ersten Anblick überrascht die letztgenannte Thatsache nicht wenig; sie findet aber ihre Erklärung darin, daß die Plateaus auf der Ostseite durch die Rocky Mts. vor den kalten Nordwinden geschützt sind. So hat denn auch Neu-Mexiko, an dessen nördlicher Grenze sich die Rocky Mts. abflachen, eine im Verhältnis zu seiner Breite kältere Wintertemperatur, als die nördlicher gelegenen und besser geschützten Plateaus. Im Sommer ist die Temperatur sehr hoch, sowohl auf den Hochflächen als auch in den engen Thalspalten. Die heißeste Region in den Vereinigten Staaten befindet sich längs des untern Laufes des Colorado und des Gila mit der Isothere von $28,8^{\circ}$. Einzelne Stationen im Coloradothale, wie Fort Mojavé und Fort Yuma, haben Maxima von $47,7^{\circ}$ und $49,4^{\circ}$. Wenn wir überlegen, daß die mittlere Temperatur der Tropen, die Region der Palmen, zwischen 25 — 30° liegt, so sehen wir, daß das Coloradothal eine ebenso hohe Sommertemperatur hat, als diese.

Der erwärmende Einfluß dieser ausgedehnten Massenerhebung geht klar aus dem Jahresmittel hervor. Die Thäler sind ebenfalls sehr warm, denn jeder in dieselben eindringende Wind ist ein Descensionswind, der sich beim Absteigen um 1° für je 100 m erwärmt. Fort Lapway in Idaho in einer Höhe von 610 m und unter $46^{\circ} 18'$ N. Br. gelegen, besitzt eine mittlere Jahrestemperatur von $11,5^{\circ}$. Dieselbe ist also bedeutend höher als diejenige, welche man in Stationen trifft, die im östlichen Teile von Nordamerika unter gleicher Breite liegen, z. B. St. John in New Brunswick, welches nur $4,5^{\circ}$

als jährliche Mitteltemperatur hat. Auffallend ist ferner sowohl die hohe Winter-, $0,6^{\circ}$, als auch die hohe Sommertemperatur, 23° , und die Maximaltemperatur von $43,3^{\circ}$. Ähnliche Verhältnisse treffen wir in Great Salt Lake City (1299 m) mit einer mittlern Jahrestemperatur von 11° , Wintertemperatur von $-0,9^{\circ}$, Sommertemperatur von 23° und Maximaltemperatur von 35° . Das östlicher gelegene Wyoming ist im Winter bedeutend kälter. Zu Fort Bridger beträgt die Wintertemperatur $-6,2^{\circ}$, weshalb die dortigen Viehzüchter, wenn der Winter herannaht, ihre Herden nach Idaho bis in die Nachbarschaft vom 45. Breitenkreise treiben, da dort, wie aus den Temperaturverhältnissen von Fort Boisé zu ersehen ist (Wintertemperatur $-1,2^{\circ}$), höhere Temperaturen vorhanden sind. Sehr deutlich zeigt sich die Erhöhung des Jahresmittels durch die hohe Sommerwärme in Camp Mc. Dermitt in Nevada, das in der Höhe von 1432 m liegt und eine mittlere Jahrestemperatur von $9,4^{\circ}$ hat. Der Winter hat $-1,5^{\circ}$, der Sommer dagegen $21,2^{\circ}$ Mitteltemperatur, die sich im Juli auf 23° steigert.

Dem Plateau ist ferner eine große Schwankung in dem täglichen Temperaturgange eigen. Auf hunderte von Meilen ist oft nirgends Wald zu sehen, nichts, was Feuchtigkeit aufsaugt und festhält. Das nackte Gestein der vielen Gebirgszüge einerseits, die weiten Ebenen, oft spärlich mit Vegetation bedeckt, anderseits, werden von der steigenden Sonne rasch erhitzt. Bei Sonnenaufgang zeigt das Thermometer 0° , um 2^h p. m. 34° , bei Sonnenuntergang 22° . In einer feuchten Atmosphäre können diese Kontraste von 0° bis 34° nie vorkommen, da einerseits beim Abkühlen der Luft das Eintreten des Taupunktes das weitere rasche Abkühlen hindert und anderseits der gefallene Tau während der Morgentemperatur viel Wärme absorbiert und so das rasche Steigen derselben hindert.

In Hanns Zeitschrift für Meteorologie, Bd. XVII, S. 38, sind folgende extreme Wärmeschwankungen mitgeteilt. (Vergl. American Journal of Science, Vol. XX, July 1880.)

							Differenz
Green River . . .	27./28. Juni 1873	11 ^h a. m.	$33,2^{\circ}$	4 ^h a. m.	$3,8^{\circ}$		$29,4^{\circ}$
Ogden (Utah) . .	30. Septbr. 1873	3 a. m.	$-0,2$	1 p. m.	$26,4$		$26,6$
Prescott (Ariz.) .	2./3. Novbr. 1872	1 p. m.	$27,3$	2 a. m.	$-1,7$		$29,0$
Gunnison	2. Novbr. 1872	2 a. m.	$-8,0$	2 p. m.	$17,2$		$25,2$
Laramie	8. Dezbr. 1872	7 a. m.	$-12,7$	1 p. m.	$17,2$		$29,9$
Cheyenne Wy. . .	9. Oktbr. 1873	6 a. m.	$-6,7$	2 p. m.	$24,4$		$31,1$
Hughes Col. . . .	13./14. Juli 1873	1 p. m.	$41,7$	5 a. m.	$11,6$		$30,1$
Labian Col. . . .	27. August 1873	4 a. m.	$11,2$	12 Mtg.	$43,7$		$32,5$

Noch größer sind dieselben zu Wickenburg (34° N., 112° 7' W, 625 m.).

1877	28. Juli:	Max.	$43,3^{\circ}$	Min.	$4,4^{\circ}$	Diff.	$38,9^{\circ}$
	31. "	"	$41,1$	"	$-1,1$	"	$42,2$
	1. Aug.	"	$42,8$	"	$2,8$	"	$40,0$

Aufserordentlich auffallend ist das Minimum ($-1,1^{\circ}$) vom 31. Juli 1877. Wickenburg liegt in einer Wüstenregion mit nur 127^{mm} Niederschlag.

Die chemische Intensität des direkten Sonnenlichtes ist viel gröfser in Höhen als an dem Meeresniveau und übt einen grofsen Einflufs auf das animalische Leben und auf die Vegetation aus. Man weifs in den Gebirgsländern sehr wohl, dafs ein kurzer Aufenthalt in den Höhen hinreicht, um mit sichtlich geröteter Haut zurückzukehren.

Eine andre Erscheinung, die diesem trockenen Klima eigen ist, ist die grofse Temperaturdifferenz zu denselben Zeiten an nahe bei einander gelegenen Orten.

Leutnant Wheeler beobachtete im Gilathale in Arizona an zwei Orten bei Sonnenaufgang $-2,9^{\circ}$ und $-7,7^{\circ}$, während auf der anstofsend grofsen Ebene die Temperatur $4,4^{\circ}$ betrug. Im ersten Falle betrug die Seehöhe 1352 m, bei dem letzten 1586 m, also trotz der bedeutenden Höhe eine höhere Temperatur! So lange die Luft eine grofse Trockenheit besitzt und die Bergreihen mit spärlicher Vegetation bedeckt sind, wird sich immer in der gröfseren Tiefe zwischen zwei Bergreihen die gröfste Temperaturerniedrigung während der Nacht zeigen, indem durch die stattfindende Abkühlung eine Luftströmung hervorgebracht wird, die an den Bergwänden aufwärts geht, während die Luft aus hohen kalten Regionen sich ins Thal hinabsenkt und hier der Bodenfläche Wärme entzieht und sie gegen den Berg hin zuführt. (Leutnant Wheelers Expedition nach Neu-Mexiko und Arizona. Petermanns Mitteilungen 1874.)

Das Maximum der Lufttemperatur an der Erdoberfläche fällt im Sommer auf den Plateaus mit dem Maximum der Insolation zusammen. Das frühere Eintreten des Maximums um Mittag wird durch die starke Wärmeabstrahlung auf diesen luftverdünnten und trockenen Höhen, welche eine weitere Ansammlung der Wärme nach Kulmination der Sonne nicht zuläfst, bedingt. Das Minimum tritt zwischen 4^{h} und 5^{h} a. m. ein.

Aus den Untersuchungen Alexander von Humboldts ist bekannt, dafs über ausgedehnten Hochländern die Temperaturabnahme nach der Höhe viel langsamer erfolgt als bei isoliert aufsteigenden Gebirgen oder in der auf Tiefebenen ruhenden Atmosphäre, weil das Plateau als eine erhöhte Grundfläche angesehen werden kann, auf welcher durch Insolation eine bedeutende Temperatur direkt entwickelt wird.

Wir finden innerhalb unsers Gebietes in der Höhe von 1600 m als Temperatur des wärmsten Monats $25-27^{\circ}$, also eine Temperatur, die fast $10-12^{\circ}$ höher ist als die unter gleicher Breite an der Küste des Stillen Ozeans. Eine direkte

Folge der verminderten Wärmeabnahme mit zunehmender Höhe ist das Hinaufrücken der Schneegrenze, wovon ein deutliches Beispiel der Pikes Peak in Colorado ist. Derselbe, obwohl er die Höhe von 4270 m erreicht, trägt keine Gletscher und erreicht nicht einmal die Schneegrenze, nur in Spalten halten sich die vom Winde zusammengehäuften Massen des Winterschnees. Freilich hängt die Höhe der Schneegrenze auch noch von andern bedeutenden Faktoren, wie Windesrichtung, Menge des Niederschlags, ab, jedoch scheinen die oben besprochenen Umstände am meisten zum Hinaufrücken der Schneegrenze am Pikes Peak beizutragen, da dort die obere Baumgrenze bis 3440 m hinaufgeht, welche Höhe in den Alpen schon in dem Bereiche des ewigen Schnees liegt.

c) Temperaturverhältnisse der pacifischen Staaten.

Begegneten wir seither bedeutenden Temperaturschwankungen, so treffen wir nur schwache Änderungen in der Winter- und Sommertemperatur, wenn wir die Sierra Nevada übersteigen und uns an die Gestade des Stillen Ozeans begeben. Große Übereinstimmung der Temperaturverhältnisse herrschen längs der Küste, wie der Lauf der Isotherme von 10° zeigt, die an derselben von 39° N. Br. bis 49° N. Br. hinläuft. Die Isothere von 15° und die Isochimene von 5° verlaufen in derselben Richtung und auch in derselben Entfernung von der Küste. Dagegen ändern sich diese Verhältnisse sehr rasch, sobald die Coast Range überschritten ist. Die Ursache der Kühle im Sommer an der Küste sieht Woeikoff (Hanns Zeitschrift 1878) darin, daß in der Nähe eine kalte Meeresströmung fließt und durch die Erwärmung im Innern ein beständiger Seewind erzeugt wird, welcher immer neue Luftmassen vom Meere her an die Küste führt. Eben derselben Strömung und den vorherrschenden westlichen Winden verdanken die pacifischen Küstenstriche der Union ihre gleichmäßige Wintertemperatur. Durch die Coast Range wird ein Austausch der untern Luftschichten verhindert, woraus sich die großen Temperaturdifferenzen diesseits und jenseits derselben erklären. Unterbrochen ist die Coast Range nur in der Nähe von San Francisco, durch welche Öffnung die kühle Seeluft sehr stark strömt, um das Gleichgewicht der Luftschichten im Innern und an der Küste herzustellen.

Nördlich von Californien in Oregon und Washington Ty. ist der Sommer nicht so kühl wie in der Nähe von San Francisco. Dies liegt darin, daß das Innere weniger erhitzt und der Seewind deshalb weniger stark aspiriert wird. Auch hier nimmt jedoch die Temperatur im Sommer rasch nach dem Innern zu, namentlich in den sogenannten Plains of the

Columbia am mittlern Lauf des Flusses, im Osten des Cascadengebirges. Im Winter ist hier natürlich das Innere kälter als die Küste. Die mittlere Wintertemperatur beträgt in Astoria 4° , in dem weiter im Innern gelegenen Fort Dalles $1,4^{\circ}$.

Die Nachbarschaft des 49. Parallels verdankt ihre milde Wintertemperatur auch dem Umstande, daß zwischen 32° — 44° N. Br. die zwei Hauptgebirgsketten ihre größte Höhe erreichen. In ihren höheren Teilen halten diese Ketten die warmen SW im Winter auf und lenken sie nach NW, der Küste entlang, ab. Weiter nach Norden, wo die Ketten weniger hoch sind, können die SW über die Gipfel und Pässe nach dem Innern eindringen und verteilen so einen Teil ihrer Wärme über die nördlichen inneren Distrikte.

Betrachten wir die Wärmeabnahme mit der Breite an der pacifischen Küste, so ist leicht zu sehen, daß hier zwischen 33° — 49° N. Br. dieselbe sehr verzögert ist. Fanden wir dieselbe an der Ostküste 1° für einen Breitengrad, so beträgt hier dieselbe nur $0,41^{\circ}$. Auffallend ist auch die außerordentliche Differenz in dem Gange der mittlern Temperaturen der extremen Jahreszeiten, die an der pacifischen Küste ungefähr 2° und an der atlantischen 18° beträgt. Im Winter ist der Kontrast zwischen denselben sehr groß. Die Isochimene von 10° an der pacifischen Küste (San Francisco) hat dieselbe geographische Breite als die Isochimene von 5° an der atlantischen Küste (Norfolk).

Die absoluten Minima sind nicht hoch in Californien; nirgends außer den Plateaus im Norden ist eine Temperatur von -10° beobachtet worden.

Betrachten wir, um uns die Temperaturverschiedenheiten ganz nahe bei einander gelegener Orte vor die Augen zu führen, die Wärmeverhältnisse von San Francisco und Sacramento City. Letztere ist, obgleich nicht sehr weit vom Meer gelegen, doch von demselben durch die Küstenkette getrennt, und besitzt ein Kontinentalklima, ganz verschieden von dem San Franciscos, dessen mittlere Temperaturen im Winter und Sommer beziehungsweise 10° C. und $14,4^{\circ}$ C. betragen, also eine Differenz von nur $4,4^{\circ}$ C. aufweisen. Zu Sacramento dagegen sinkt die Wintertemperatur auf $8,8^{\circ}$, und die Sommer-temperatur steigt auf $21,7^{\circ}$, mithin wächst die Differenz auf $12,9^{\circ}$. Die Oberflächentemperatur des Wassers in der San Franciscobay beträgt im Mittel $7,2^{\circ}$ und übersteigt zur wärmsten Zeit selten $18,3^{\circ}$. Sind die jährlichen Temperaturschwankungen zu San Francisco sehr gering, so sind die täglichen dagegen oft erheblich und betragen nicht selten 12 bis 14° . Der Herausgeber einer Zeitung zu San Francisco

schildert den täglichen Wärmegang folgendermaßen: „Man geht des Morgens aus in dicken wollenen Ober- und Unterkleidern, die bis an den Hals zugeknöpft sind. Um 8 $\frac{1}{2}$ Uhr knöpft man den Überrock etwas auf, um 9 Uhr denselben ganz, und um 9 $\frac{1}{2}$ Uhr wird er ganz ausgezogen. Um 10 Uhr wird der wollene Unterrock durch einen Sommerrock ersetzt und um 11 Uhr zieht man leichte Sommerkleider an; um 4 Uhr beginnt es kühl zu werden, und man legt die wollenen Kleider wieder an, um 7 Uhr ist der Überrock bis zum Kinn zugeknöpft und man zittert bis zum Schlafengehen.“ Wenn auch diese Beschreibung etwas übertrieben ist, so gibt sie doch ein treffliches Bild vom täglichen Wärmegange.

Obwohl es in San Francisco nie eigentlich wintert, so ist doch das Klima im Sommer der heftigen Nordwinde wegen, die sich um Mittag erheben und bis zum Abend wehen, keineswegs das angenehmste. Während der Regenzeit von November bis April bleibt der ungastliche Nordwind verdrängt und diese Jahreszeit bietet, wenn die Niederschläge pausieren, die herrlichsten Tage mit lauem Westwind und wolkenlosem Himmel.

Das Klima der Sierra Nevada wechselt natürlich mit der Höhe, doch nicht so auffällig und so rasch als man erwarten könnte. Wer von San Francisco kommt, muß beträchtlich an den Abhängen der Sierra Nevada emporsteigen, ehe er zu einer Region gelangt, wo die mittlere Sommertemperatur ebenso niedrig ist als in jener Stadt; denn die Temperaturabnahme beträgt 1° für je 250m Höhe. Bis zu einer Höhe von 2450—3000m ist es den Tag über ganz angenehm warm, die Nächte dagegen sind beträchtlich kühl.

In dem San Joaquinthale und seiner nördlichen Fortsetzung, dem Sacramentothale, finden wir während des Sommers eine sehr große Wärmeanhäufung. Die mittlere Sommertemperatur des zentralen Teiles des Joaquinthales erhebt sich über 28°, während sie an der Seeküste unter 15,5° bleibt.

Es scheidet also die Coast Range Californien in Beziehung auf seine klimatischen Erscheinungen in zwei Teile, nämlich in die Küstenzone mit ozeanischem Klima und in die jenseits der Küstenkette liegenden Längsthäler mit mehr kontinentalem Klima, das sich an das der Plateaus im Osten enge anschließt, ohne jedoch nachts und im Winter eine solche Abkühlung zu erfahren.

Anmerkung: Nachfolgende Tabellen stützen sich auf Schotts Tables of the Atmospheric Temperature in the United States (Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. XXI, Washington 1873). Die Angaben der mit H. bezeichneten Stationen sind aus der Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, redigiert von Hann, entlehnt.

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Jahr			Jahreszeiten				Monat	
				Mittel.	Maxim.	Minim.	Amplit.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.
Grönland.												
Floeberg Beach H. 1 J.	82° 27'	61° 22'	..	—19,8	10,0	—58,8	43,4	—35,0	—26,4	1,3	März	—39,9 Juli
Discovery Bay H.	81 44	65 3	..	—20,1	7,9	—57,1	41,3	—36,3	—26,0	1,3	"	—38,4 "
Polarisbay H.	81 36	62 15	..	—15,5	11,7	—43,7	35,5	—29,1	—20,4	2,9	"	—30,8 "
Van Rensselaer Harbor.	78 37	70 53	..	—19,2	12,1	—54,7	40,5	—33,7	—23,7	0,8	"	—37,1 "
Port Foulke	78 18	73 00	..	—14,4	16,1	—43,0	36,9	—29,6	—19,5	2,7	Jan.	—32,2 "
Wolstenholme Sound	76 34	68 45	..	—15,4	12,8	—47,8	39,3	—33,7	—16,9	3,3	Febr.	—34,6 "
Upemvik	72 48	56 0	..	—10,5	—	—	32,1	—24,6	—14,1	3,3	"	—28,0 "
Omenak	70 41	52 0	..	—7,7	—	—	28,8	—20,6	—10,0	4,9	"	—22,7 "
Jacobshavn	69 12	50 55	..	—5,9	—	—	26,3	—17,3	—7,6	5,5	"	—19,0 "
Godthaab	64 10	51 46	..	—2,9	—	—	16,4	—10,0	—4,8	4,7	Jan.	—10,9 "
Frederikshaab.	62 00	49 24	..	—0,9	—	—	16,1	—8,3	—1,3	5,9	"	—9,6 "
Lichtenau	60 22	45 40	..	0,5	—	—	14,1	—5,7	—0,6	6,1	"	—6,8 "
Sabine-Insel 1 Jahr.	74 32	18 49	..	—11,7	13,1	—40,2	29,0	—22,1	—14,5	2,0	Febr.	—25 "

Britisch-Nordamerika.

Northumberland Sund 1 J.	76° 52'	97° 00'	..	-17,4	13,9	-49,4	41,8	-35,7	-19,9	1,2	Febr.	-39,2 Juli
Wellingtonkanal 1 Jahr H.	75 31	92 10	..	-14,7	8,9	-38,9	33,6	-27,6	-18,4	1,5	"	-30,2 "
Melville-Insel 1 Jahr H.	74 74	110 48	..	-17,0	—	-51,2	41,4	-33,3	-19,6	2,8	"	-35,6 "
Assistancebay 1 Jahr H.	74 40	94 16	..	-16,4	10,0	-42,8	37,9	-32,7	-20,7	2,2	"	-34,6 "
Griffith Island 1 Jahr H.	74 34	95 20	..	-17,7	13,9	-43,3	38,3	-33,8	-22,1	1,4	"	-35,8 "
Port Kennedy 1 J. 1 M. H.	72 01	94 14	..	-16,8	12,8	-45,4	43,0	-37,4	-19,0	3,2	"	-38,5 "
Victoriahafen 11 M. H.	70 08	91 35	..	-16,1	12,2	-49,2	39,5	-31,5	-21,8	1,8	März	-36,2 "
Felixhafen 1 Jahr H.	69 59	92 01	..	-14,4	21,1	-43,9	40,8	-32,1	-18,5	4,9	Febr.	-33,7 "
Repulsebay, F. Hope H.	66 32	86 56	..	—	14,7	-45,6	—	-33,3	-17	—	Jan.	-36,2 "
Hudsonstraile 1 Jahr H.	65-63°	84-75°	..	-12,7	15,0	-42,6	34,8	-30,0	-11,8	1,5	"	-31,7 "
Port Hope	67 32	134 30	..	-10,2	—	—	46,0	-31,1	-11,3	12,5	"	-31,3 "
Port Confidence H. . .	66 40	119 00	..	—	—	-50,0	—	-33,9	-13,1	—	"	—
Fort Franklin.	65 1	123 12	..	-8,2	—	—	41,3	-27,0	-10,0	10,1	"	-30,1 "

Stationen.	Breite. W. v. Gr.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Jahr			Jahreszeiten			Monat				
				Mittel.	Maxim.	Minim.	Amplit.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kaltester.	wärmster.	
Fort Simpson	62° 10'	121° 10'	91	-3,8	40° Juli 1865	-48,3	—	-23,8	-3,2	15,0	-3,2	Jan.	-25,2	—
Fort Chipewyan.	58 43	111 15	213	-2,5	—	—	39,5	-19,6	—	14,8	0,0	"	-22,6	Juli 17,2
Fort Churchill	58 50	94 30	6	-6,8	—	—	47,7	-30,0	—	11,4	-3,8	"	-33,3	14,4
York Factory (5—6 J.) H. . .	57 0	92 26	10	-5,6	—	—	37,3	-23,2	—	7,8	-3,0	Febr.	-23,9	13,4
Hebron	58 20	63 30	..	-4,4	—	—	29,3	-18	—	7,5	-1,3	Jan.	-20,5	Aug. 8,4
Ramah 2 Jahre H.	58 54	62 57	5	—	—	—	26,3	-16,0	—	7,2	1,3	"	-17,9	8,4
Hoffenthal H. 6 J.	55 35	60 0	..	-3,3	—	—	30,4	-17,9	—	8,8	1	"	-19,8	Juli 10,6
Norway House	53 50	98 0	..	-2,0	—	—	39,1	-19,3	—	15,5	-1,1	"	-21,6	" 17,5
Winnipeg, Manitoba, H.														
11 Jahre	49 55	97 07	226	0,6	37,5	-47,5	38,3	-17,9	—	17,8	2,2	"	-19,2	" 19,1
Red River, Settlement . . .	49 05	97 0	200	1,2	—	—	38,4	-18,3	—	18,3	3,4	"	-18,7	" 19,7
Abbitbe	48 50	77 45	..	-0,5	—	—	41,1	-17,8	—	18,6	2,7	Febr.	-19,3	" 21,8
Anticosti Island H. 8 J. . .	49 24	63 36	6	2	25,6	-31,8	26,0	-9,6	—	13,1	5,3	Jan.	-11,3	Aug. 14,7
St. Johns, Newfoundland . .	47 34	52 40	59	3,4	31,6	-25,5	19,1	-4,9	—	12,2	6,5	"	-4,8	" 14,3
Halifax, Nova-Scotia. . . .	44 39	63 55	2,5	6,4	33,3	-26,1	22,7	-3,7	—	16,5	9,2	"	-4,7	Juli 18
St. John, New Brunswick . .	45 22	66 04	40	4,5	—	—	20,1	-6,1	—	14,2	7,2	Dez.	-5	" 15,1
Point Lepreaux 6 J. H. . . .	45 4	66 28	14	4,3	—	—	19,9	-5,1	—	12,4	7,6	Jan.	-6,2	Aug. 13,7
Montreal 15 Jahre	45 31	73 33	18	7,1	38,3	-35,5	32,2	-8,4	—	21,5	8,2	"	-9,4	Juli 22,8
Quebec, Canada	46 49	71 12	91	4,6	—	—	32,7	-10,3	—	18,5	6,6	"	-12,2	" 20,5
Lake Temiscamingue	47 19	79 13	192	4,2	—	—	32,1	-9,3	—	18,4	4,4	"	-12,6	" 19,5
Kingston	44 13	76 29	91	7,2	—	—	29,0	-6,1	—	19,1	8,3	"	-8,8	" 20,2
Toronto	43 39	79 23	104	6,8	37,2	-32,7	24,4	-4,4	—	18,3	8,2	"	-4,9	" 19,5
Britisch-Columbia, N.-Westm.	49 12	122 53	10	8,7	28,9	-9,2	16,7	-1,9	—	15,8	8,8	Dez.	1,5	Aug. 16,6
Vancouver Island H.	45-50°	120-125°	..	9,9	30,5	-9,4	8,8	6,5	—	13,6	10,2	Febr.	6,1	" 14,9
Vereinigte Staaten.														
Alabama.														
Mobile	30° 41'	88° 02'	4	18,9	36,7	-7,2	15,8	11,3	—	26,1	19,0	Jan.	10,7	Juli 26,5
Huntsville	34 45	86 40	183	15,2	35,5	-22,7	19,2	5,6	—	24,2	15,4	Dez.	5,4	" 24,6
Alaska. (Dall, Meteorology of Alaska.)														
Fort Tongass 2 J. 4 M. . . .	54° 46'	131° 30'	6	8,0	33,3	-18,9	14	2,2	—	14,5	8,6	Jan.	1,0	Aug. 15,0
Sitka 44 J. 2 M.	57 03	135 19	5	6,3	31,0	-20	13,7	0,3	—	12,5	7,2	"	-0,4	Juli 13,1

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Jahr		Amplit.	Jahreszeiten				Monat		
				Mittel.	Maxim.		Minim.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.	wärmster.
Fort Wrangel, Harbor 3 J. 8 M. . . .	56° 16'	132° 28'	6	5,7	33,3	-23,3	17,7	-2,1	4,7	13,9	6,1	Jan.	-3,0 Juli 14,7
St. Paul, Kadiak Island 1 J. 5 M.	57 47	152 20	6	5,3	23,9	-14,4	16,2	-1,2	2,9	12,7	6,8	Febr.	-2,3 Juli 13,9
Iluluk Unalaska 8 J. . .	53 52	166 31	6	3,5	25,0	-18,1	12,3	-0,9	1,1	9,2	4,5	Jan.	-1,3 Aug. 11,0
St. Paul Island 5 J. 5 M.	57 07	170 17	15	2,1	17,2	-24,4	12,6	-2,3	-1,8	7,5	4,2	Febr.	-3,5 „ 9,1
St. Michaels, Norton Sound	63 28	161 48	9	-2,9	26,2	-45,6 Febr. 1877	29,4	-15,6	-6,2	10,9	-1	Febr.	-16,8 Juli 12,6
Port Clarence 2 J. . . .	65 17	166 20	..	-6,8	—	-42,8	33,9	-19,7	-8,8	7,4	-5,9	Jan.	-24,0 „ 9,9
Point Barrow 2 J. . . .	71 21	156 16	..	-14,2	11,1	(wenigst.) -51	33,9	-27,8	-16,5	2,0	-14,2	Febr.	-30,3 Aug. 3,6
Port Yukon 1 J.	66 33	145 17	125	-8,8	30	-41,8	51,3	-31,0	-9,7	13,7	-8,1	Jan.	-32,6 Juli 18,7
Ikogmut	61 47	161 13	..	-4,2	—	—	—	-17,3	-6,8	9,7	-2,3	Febr.	-20,7 „ 10,6
Arizona.													
Camp Goodwin	32 52	109 51	..	19,0	43,9	-12,2	23,5	8,2	18,6	29,1	19,9	Jan.	7,0 Juli 30,5
Fort Mojavé	35 06	114 35	184	22,9	47,7	-10,0	23,5	12,2	22,6	33,6	23,1	„	11,2 „ 34,7
Camp Grant	32 54	110 40	..	19,8	46,6	-8,9	22,4	9,4	19,4	29,7	20,7	„	8,4 „ 30,8
Camp Verde	34 32	111 54	..	17,3	45,0	-15,0	25,4	7,2	16,8	28,1	17,3	Dezbr.	5,4 „ 30,8
Fort Canby	34 43	109 10	1981	8,7	37,2	-31,6	25,8	-2,6	8,4	20,3	8,8	Jan.	-4,4 „ 21,4
Arkansas.													
Washington	33 44	93 41	201	16,4	42,2	-21,1	20,6	7,0	16,8	25,6	16,2	Jan.	6,0 Juli 26,6
California.													
Fort Crook	41 07	121 29	1033	10,4	39,4	-28,9	23,7	0,3	9,4	20,9	11,0	Jan.	-1,3 Juli 22,4
Fort Humboldt	40 45	124 10	15	11,6	31,7	-8,9	6,7	8,3	11,1	14,5	12,4	Dezbr.	7,8 Juni 14,5
Fort Yuma	32 46	114 44	61	23,7	47,2	-9,4	21,1	14,4	23,0	33,3	24,2	Jan.	13,4 Juli 34,5
Monterey	36 37	121 52	12	13,0	35,0	-9,8	5,7	10,1	12,5	15,4	14,0	„	10,0 Aug. 15,7
Fort Miller	37 00	119 40	122	19,2	49,4	-5,0	22,8	9,6	18,0	29,8	19,3	Dezbr.	8,6 Juli 31,4
Sacramento	38 34	121 26	16	15,5	38,9	-2,2	14,4	8,8	15,1	21,7	16,5	„	8,2 „ 22,6
San Francisco	37 48	122 25	40	12,9	35	-2,8	6,0	10,0	12,7	14,4	14,3	Jan.	9,3 Sept. 15,4

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Mittel.	Jahr		Amplit.	Jahreszeiten			Monat	
					Maxim.	Minim.		Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.
Colorado.												
Hanns Zschr. 1876												
Denver	39° 45'	105° 31'	1600	10,6	38,9	-23,9	25,1	-4,6	9,8	22,1	10,8	Dezbr. u. Jan.
Colorado Springs	39 12	—	1829	8,6	31,1	-28,9	26,5	-1,2	3,2	19,5	7,6	Febr.
Pikes Peak (Hann)	38 50	105 52	4300	-7,3	15,0	-32,2	23,3	-15,8	-11,1	3,9	-6,0	"
Fort Garland	37 32	105 40	2550	6,0	36,1	-40,0	26,8	-6,3	6,0	18,0	6,3	Jan.
Fort Lyon	38 8	102 50	1219	11,1	42,2	-31,7	29,7	-1,6	10,7	24,9	10,4	"
Fort Sedgwick	40 58	102 23	1097	9,9	—	—	29,2	-1,8	8,2	23,2	10,0	"
Connecticut.												
New Haven	41 18	72 57	14	9,4	38,9	-31,1	24,3	-2,0	8,2	20,8	10,7	Jan.
Dakota.												
Fort Buford	48 01	103 58	579	4,0	41,1	-38,9	35,9	-11,2	4,6	20,8	5,8	Jan.
Fort Abercrombie	46 27	96 11	..	4,6	40,0	-40,0	38,1	-13,3	3,7	21,6	6,5	"
Fort Ransom	46 35	97 47	..	4,2	39,4	-33,8	35,2	-12,0	4,3	19,4	5,2	"
Fort Sully	44 50	100 35	512	7,7	45,5	-34,4	39,7	-6,3	6,0	22,6	8,5	"
District of Columbia.												
Washington	38 54	77 02	23	13,4	39,4	-25,5	24,5	2,2	13,1	24,6	13,5	Jan.
Florida.												
Fort Brooke	27 57	82 26	6	22,1	36,7	-3,3	11,2	16,6	22,1	26,8	23,0	Jan.
Jacksonville	30 20	81 39	6	20,5	—	—	15,4	13,1	20,6	27,2	21,1	Dezbr.
Key West	24 33	81 48	3	25,0	36,7	6,7	8,1	21,3	24,3	27,9	25,8	Jan.
Georgia.												
Atlanta	33 45	84 24	320	14,6	36,1	-16,1	20,3	5,4	14,5	23,7	14,6	Jan.
Savannah	32 05	81 06	13	19,3	38,9	-9,4	16,8	11,4	19,3	27,0	19,4	"
Idaho.												
Fort Boise	43 40	116 00	..	11,3	49,4	-25,5	28,7	-1,2	11,1	23,9	11,6	Jan.
Fort Lapway	46 18	116 54	610	11,5	43,3	-26,1	22,3	0,6	11,6	23,0	10,9	"
Illinois.												
Chicago	41 54	87 38	183	7,7	41,1	-31,6	26,3	-4,0	6,4	19,3	9,0	Jan.
Springfield	39 48	89 40	168	9,8	39,4	-27,7	29,1	-2,4	9,1	23,3	9,4	"

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Mittel.	Jahr		Amplit.	Jahreszeiten				Monat	
					Maxim.	Minim.		Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.	wärmster.
Indiana.													
Indianapolis	39° 47'	86° 09'	213	10,3	—	—	26,7	—1,8	9,6	22,5	11,0	Jan.	—3,1 Juli 23,6
Indian Territory.													
Fort Arbuckle	34 29	97 17	305	16,1	42,7	—20,0	24,0	4,8	16,4	26,8	16,3	Jan.	3,3 Juli 27,3
Fort Gibson	35 48	95 20	170	15,8	46,7	—28,9	23,3	4,5	16,1	26,1	16,3	"	3,8 " 27,1
Iowa.													
Davenport	41 30	90 39	225	8,5	35,0	—31,1	30,5	—5,3	7,6	22,0	9,6	Jan.	—7,1 Juli 23,4
Fort Dodge	42 31	94 12	288	7,7	37,2	—33,3	33,7	—7,3	5,8	22,7	9,5	"	—9,1 " 24,6
Des Moines City	41 36	93 38	238	9,4	—	—	29,2	—3,6	10,0	22,1	9,2	"	—4,7 " 24,5
Kansas.													
Atchison	39 34	95 08	305	10,7	38,3	—25,5	30,0	—2,8	9,9	23,7	12,0	Jan.	—4,6 Juli 25,4
Fort Larned	38 10	98 57	589	12,4	46,1	—30,0	28,7	—0,2	11,0	25,2	13,5	"	—2,2 " 26,5
Fort Dodge	37 30	100 00	..	13,2	39,4	—23,3	28,7	1,3	12,7	25,3	13,3	"	—0,6 " 28,1
Lawrence	38 58	95 12	259	11,9	38,3	—26,6	27,0	—0,2	11,0	24,3	11,6	"	—0,9 " 26,1
Kentucky.													
Danville	37 40	84 48	274	13,9	—	—	23,2	3,2	13,5	24,2	14,8	Jan.	1,9 Juli 25,1
Chilesburg	38 04	84 18	274	12,0	36,6	—21,1	24,1	1,0	11,5	22,8	12,6	"	—0,4 " 24,5
Louisiana.													
New Orleans	29 56	90 03	7	20,6	37,8	—8,3	15,2	13,3	20,7	27,2	21,0	Jan.	12,6 Juli 27,8
Baton Rouge	30 26	91 11	12	20,0	38,9	—13,3	16,1	12,3	20,5	27,4	20,0	"	11,6 " 27,7
Maine.													
Brunswick	43 54	69 57	22	6,9	38,9	—35,5	26,2	—5,2	5,7	18,4	8,7	Jan.	—6,6 Juli 19,6
Fort Kent	47 15	68 35	175	2,6	—	—	29,2	—11,7	1,6	16,4	4,1	"	—11,8 Aug. 17,4
Hancock Barracks	46 07	67 49	190	4,9	37,2	—31,1	28,4	—8,5	4,0	17,7	6,4	"	—9,5 Juli 18,9
Portland	43 39	70 15	26	5,9	35,5	—31,1	26,1	—5,8	4,5	17,6	7,6	"	—7,1 " 19,0
Maryland.													
Baltimore	39 17	76 37	24	11,9	36,6	—22,8	23,9	0,9	10,8	23,6	12,6	Jan.	0,3 Juli 24,2

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Mittel.	Jahr		Amplit.	Jahreszeiten			Monat	
					Maxim.	Minim.		Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.
Massachusetts.												
Worcester	42° 16'	71° 49'	161	8,4	34,4	-28,3	26,2	-3,5	7,2	20,1	10,0	Jan. -4,6 Juli 21,6
Boston	42 21	71 03	55	9,0	—	—	—	-2,2	7,6	20,3	10,5	—3,2 „ 21,9
Michigan.												
Lansing	42 46	84 36	273	8,1	37,2	-30,0	26,0	-3,9	7,3	20,2	8,7	Jan. -4,6 Juli 21,4
Fort Brady	46 30	84 28	183	4,7	36,6	-43,8	27,5	-7,7	3,1	17,0	6,5	Febr. -8,9 „ 18,6
Marquette	46 32	87 35	216	5,2	39,4	-36,1	26,1	-6,9	3,0	17,3	7,1	„ -7,8 „ 18,3
Thunder Bay Island	45 02	83 17	186	5,9	—	—	23,6	-4,3	2,9	16,7	8,3	„ -5,2 Aug. 18,4
Minnesota.												
Beaver Bay	47 12	91 18	387	3,2	35,5	-37,2	27,3	-9,7	1,8	15,4	5,4	Jan. -10,6 Juli 16,7
Fort Ripley	46 10	94 24	344	4,5	39,4	-42,2	35,0	-12,1	4,3	19,7	6,2	„ -13,6 „ 21,4
Minneapolis	44 58	93 15	261	5,3	38,3	-40,0	34,0	-10,6	4,5	20,1	7,4	„ -12,3 „ 21,7
St. Paul	44 56	93 05	244	5,7	37,2	-39,4	32,9	-9,4	5,1	20,0	7,2	„ -11,5 „ 21,4
Mississippi.												
Columbus	33 31	88 28	69	16,7	37,8	-12,2	20,6	7,5	16,7	26,0	7,5	Jan. 6,2 Juli 26,8
Natchez	31 34	91 27	80	18,5	34,4	-8,9	17,8	10,2	18,6	26,5	18,5	„ 9,3 „ 27,1
Vicksburg	32 23	90 50	107	18,6	36,1	-8,3	18,5	10,2	18,7	26,9	18,6	„ 8,9 „ 27,4
Missouri.												
Harrisonville	38 38	94 25	..	11,3	40,5	-25,5	28,0	-1,3	10,7	23,5	12,2	Jan. -3,0 Juli 25,0
St. Louis	38 37	90 12	147	12,8	42,2	-31,7	26,1	0,6	12,7	24,5	13,2	„ -0,5 „ 25,6
Montana.												
Deer Lodge City.	46 26	112 32	1292	5,2	36,7	-37,8	24,8	-5,4	5,2	16,6	4,7	Jan. -6,3 Juli 18,5
Fort Shaw	47 30	111 42	1829	8,0	44,4	-41,6	29,3	-3,6	7,3	19,7	8,7	„ -7,6 „ 21,7
Fort Benton	47 50	110 39	832	8,5	40,5	-46,1	32,3	-3,8	7,0	21,7	9,3	„ -7,0 „ 25,3
Fort Ellis	45 32	111 12	146	7,3	38,9	-47,2	25,7	-3,3	6,4	19,2	7,0	„ -4,8 „ 20,9
Nebraska.												
Fort Mc. Pherson	41 0	100 30	..	11,2	46,1	-31,1	28,4	-0,4	10,0	24,1	11,2	Jan. -1,8 Juli 26,6
Nebraska City	40 41	95 51	373	10,4	—	—	29,1	-2,8	10,7	23,4	10,5	Dez. -3,7 „ 25,4

S t a t i o n e n.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Mittel.	J a h r		J a h r e s z e i t e n				M o n a t		
					Maxim.	Minim.	Amplit.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.	wärmster.
Nevada.													
Camp Mc. Dunill	. . .	41° 58' 117° 40'	1432	9,4	40,0	—22,7	25,4	—1,5	7,5	21,2	10,4	Jan.	23,0
Fort Churchill	. . .	39 17 119 19	1306	12,3	37,8	—22,8	25,7	1,4	11,3	23,9	12,4	"	25,7
Camp Halleck	. . .	40 42 115 30	1707	8,4	43,9	—30,0	25,1	—2,5	7,4	19,7	9,0	"	20,9
New Hampshire.													
Stratford		44 40 71 39	305	4,2	37,8	—38,3	28,8	—9,1	3,1	17,1	5,9	Jan.	18,4
New Mexico.													
Fort Bascom		35 24 103 50	..	16,7	42,8	—27,8	25,4	5,0	17,3	26,8	17,8	Jan.	27,7
Fort Fillmore.		32 14 106 42	1200	17,7	41,7	—17,7	21,9	7,8	17,6	27,8	18,0	"	28,3
Fort Cummings		32 32 107 40	..	18,0	41,7	—20,5	19,1	8,6	17,7	26,2	19,8	Dez.	27,2
Albuquerque		35 06 106 38	1534	13,8	45,5	—20,5	25,3	1,5	13,5	24,5	13,5	Jan.	25,7
Fort Mc. Rae.		33 18 107 03	1372	15,7	48,8	—16,1	23,8	4,0	16,2	26,3	16,2	"	27,4
Fort Stanton		33 29 105 38	..	11,2	37,8	—18,9	19,3	2,2	11,4	20,3	10,9	"	20,7
Fort Union		35 54 104 57	2033	10,3	38,3	—33,3	21,0	0,8	9,7	19,9	10,8	"	21,0
Fort Wingate.		35 30 107 45	..	11,2	38,9	—26,6	24,2	0,4	10,8	21,8	11,8	"	23,2
Santa Fé		35 41 106 02	2087	10,3	37,8	—23,9	24,2	—1,0	10,0	21,4	10,7	"	22,2
New York.													
Albany.		42 39 73 44	40	9,1	36,1	—30,6	26,6	—3,4	8,7	21,2	10,0	Jan.	22,3
Gouverneur		44 20 75 27	125	6,2	37,8	—40	29,1	—7,3	5,5	19,3	7,4	"	20,9
Lowville		43 47 75 30	258	6,5	37,8	—40	26,7	—5,8	5,9	18,4	7,7	"	19,9
Sackett's Harbor.		43 55 76 07	81	8,0	33,9	—43,3	27,2	—4,6	6,0	20,3	10,4	"	21,2
Salem		43 09 73 20	..	8,0	38,9	—40	26,1	—4,1	7,2	20,1	9,1	"	20,8
Buffalo.		42 53 78 52	183	8,1	36,6	—26,1	25,0	—2,9	6,0	19,6	9,7	"	20,9
Plattsburgh Academy		44 41 73 26	56	6,6	36,6	—28,9	27,8	—6,4	5,3	19,2	8,2	"	20,4
North Carolina.													
Fort Johnston		33 55 78 01	6	18,7	38,9	—16,1	18,1	10,3	18,0	26,8	19,7	Jan.	27,6
Asheville		35 33 82 30	670	12,1	—	—	19,5	3,3	11,4	21,4	12,3	Dez.	22,4
Ohio.													
Cincinnati.		39 06 84 30	165	12,6	38,8	—72,2	24,9	1,2	12,3	24,0	12,9	Jan.	25,4
Cleveland		41 30 81 42	196	9,4	35,5	—25,0	25,4	—2,0	7,9	20,9	10,9	"	22,0
Marietta		39 28 81 26	204	11,2	38,9	—30,0	23,3	0,4	11,0	21,8	11,6	"	22,8

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Mittel.	Jahr		Amplit.	Jahreszeiten					Monat	
					Maxim.	Minim.		Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.	wärmster.	
Oregon.														
Astoria	46° 11'	123° 48'	16	10,0	31,7	—9,4	12,4	4,0	15,3	11,3	Jan.	3,5 Aug.	15,9	
Fort Dalles	45 33	120 50	107	11,8	40,6	—30,5	23,4	1,4	21,8	12,0	"	—0,2 Juli	23,2	
Fort Orford	42 44	124 29	15	12,1	33,3	—1,1	7,0	9,2	11,1	15,4	Febr.	9,0 "	16,0	
Pennsylvania.														
Alleghany Arsenal	40 29	79 59	215	10,6	37,8	—30,0	24,7	—0,6	10,1	22,0	11,1	—1,7 Juli	23,0	
Harrisburg.	40 16	76 53	114	12,0	35,5	—18,9	26,6	0,1	10,9	24,2	13,0	—0,7 "	25,9	
Philadelphia	39 56	75 10	41	11,2	38,3	—23,3	25,4	—0,8	10,4	22,8	12,2	—1,4 "	24,0	
Rhode Island.														
Providence.	41 50	71 24	47	8,8	37,2	—27,2	25,0	—2,5	7,3	19,9	10,5	—3,4 Juli	21,6	
South Carolina.														
Charleston.	32 47	79 56	6	18,6	38,3	—8,9	17,2	10,8	18,6	26,4	18,6	9,6 Juli	26,8	
Tennessee.														
Knoxville	35 56	83 56	305	13,7	—	—	23,3	3,2	13,2	23,7	14,8	2,0 Juli	25,3	
Greenwood.	36 28	87 20	147	13,6	37,2	—22,2	21,9	3,6	13,5	23,3	13,9	2,4 "	24,3	
Texas.														
Fort Belknap.	33 08	98 46	488	17,9	43,3	—17,2	24,9	6,5	18,1	28,5	18,5	4,6 Juli	29,5	
Fort Graham.	32 00	97 21	274	18,7	44,4	—15	21,3	9,3	18,2	28,0	19,3	8,0 Aug.	29,3	
Fort Mc. Intosh.	27 35	99 48	246	23,0	43,3	—8,3	18,2	14,0	24,4	30,3	23,2	12,6 "	30,8	
Fort Mason.	30 40	99 15	366	19,3	45,5	—11,7	19,8	10,4	19,8	27,9	19,1	8,9 Juli	28,7	
Fort Terrett	30 20	100 11	402	17,5	—	—	19,0	8,1	18,5	25,3	18,2	6,9 Aug.	25,9	
Galveston	29 18	94 47	9	20,8	—	—	18,5	11,9	20,8	28,7	21,6	10,8 "	29,3	
Utah.														
Fort Crittenden	40 12	112 06	1481	9,3	39,4	—30,0	31,6	—4,3	9,2	23,3	9,3	—7,0 Aug.	24,6	
Great Salt Lake City	40 46	111 54	1300	11,0	35,0	—22,2	28,2	—0,9	9,9	23,0	11,9	—3,4 "	24,8	
Vermont.														
Craftsbury.	44 40	72 23	335	4,3	38,3	—31,7	28,6	—8,8	3,1	17,1	6,0	—10,2 Juli	18,4	
Burlington.	44 28	73 12	105	6,7	—	—	26,9	—6,2	5,3	19,2	8,4	—6,6 "	20,3	

Stationen.	Breite.	Länge W. v. Gr.	Höhe.	Jahr			Jahreszeiten					Monat	
				Mittel.	Maxim.	Minim.	Amplit.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.	kältester.	wärmster.
Virginia.													
Norfolk	36° 51'	76° 17'	6	15,0	40	-16,6	21,0	5,3	13,6	24,7	16,3	Jan.	4,7 Juli 25,7
Richmond	37 32	77 26	52	14,2	—	—	22,4	4,4	13,4	24,2	14,4	„	2,9 „ 25,3
Washington Territory.													
Cape Disappointment	46 17	124 03	9	11,5	40,0	-8,3	11,8	6,4	10,4	16,3	12,8	Jan.	5,1 Juli 16,9
Fort Colville	48 42	118 02	598	7,2	39,4	-34,4	28,1	-4,4	7,3	19,4	6,4	„	-7,1 „ 21,0
Fort Vancouver	45 40	122 30	15	11,2	36,6	-23,3	17,0	3,5	11,0	18,8	11,6	„	2,7 „ 19,7
Camp Steele	48 28	123 01	46	10,1	35,0	-12,2	13,3	4,3	9,4	16,0	10,6	„	3,3 „ 16,6
West Virginia.													
Kanawha	38 53	81 25	..	12,3	—	—	21,6	2,6	12,4	21,9	12,6	Jan.	1,0 Juli 22,6
Wisconsin.													
Milwaukee	43 04	88 00	184	7,6	37,8	-34,4	26,8	-4,4	6,1	19,4	9,4	Jan.	-5,8 Juli 21,0
Manitowoc	44 07	87 46	200	6,9	36,1	-32,1	25,6	-4,6	5,3	18,5	8,4	„	-5,7 „ 19,9
Superior City	46 44	92 13	207	3,4	37,2	-38,8	29,4	-11,5	1,8	16,6	5,6	„	-11,4 „ 18,0
Waupaca	44 21	89 10	274	7,4	36,6	-34,4	30,7	-6,4	6,1	21,2	8,6	„	-8,2 „ 22,5
Wyoming.													
Fort Bridger	41 20	110 23	2029	5,1	33,3	-36,1	25,8	-6,2	3,7	17,2	5,8	Jan.	-7,3 Juli 18,5
Fort Steele	41 45	107 10	2085	6,6	40,0	-38,9	27,4	-5,3	5,0	19,0	7,8	Dezbr.	-6,6 „ 20,8
Fort Laramie	42 12	104 31	1363	9,7	40,6	-40,0	26,8	-1,5	8,3	22,5	9,6	„	-2,4 „ 24,4
Fort Sanders	41 13	105 38	2183	5,4	36,1	-45,6	25,3	-4,8	3,4	16,6	6,8	Jan.	-6,3 „ 19,0

B. Niederschläge.

Nach der Herkunft der Niederschläge Nordamerikas sind 3 Hauptregionen zu unterscheiden, von welchen die eine ihre atmosphärische Feuchtigkeit vom Atlantischen Ozean und nördlichen Eismeer, die andre vom Golf von Mexiko und die letzte vom Stillen Ozean empfängt.

Zu der ersten Gruppe, bei welcher beide Meere auf natürliche Weise nicht zu trennen sind, ist fast das ganze polare Nordamerika mit Grönland, sowie die Ostküste der Vereinigten Staaten zu rechnen; zur zweiten der ungeheure Raum zwischen den Rocky Mountains, den Alleghanies und dem Golfe von Mexiko, und zur letzten die Westküste bis zu den Rocky Mountains.

I. Atlantische und arktische Region.

1. Grönland.

Genaue und direkte Messungen der Niederschläge besitzen wir von nur wenigen dänischen Stationen auf der Westseite Grönlands. Dieselben, sowie die vorliegenden Berichte der arktischen Expeditionen, zeigen, daß Grönland, besonders der nördliche Teil, arm an Niederschlägen ist, namentlich im Winter.

An der Ostküste, dem Arbeitsfelde der zweiten deutschen Nordpolexpedition unter Capt. Koldewey, sind es hauptsächlich die Nordwinde, welche die größte Trübung der Atmosphäre und die meisten Niederschläge bringen; die westlichen Winde dagegen haben Heiterkeit und die tiefsten Temperaturen im Gefolge. Es wurden 80 Tage (1. Aug. 1869 bis 31. Juli 1870) mit völlig wolkenleerem Himmel notiert. Leider wurden Beobachtungen über Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge nicht angestellt, ein Beweis aber für die Trockenheit der Luft sind die Seltenheit der Niederschläge und das beständig klare Wetter bei stiller Luft, namentlich im Herbst, sowie der Umstand, daß selbst bei der strengsten Kälte der menschliche Atem nicht in Gestalt von Nebel sichtbar wurde, was in unserm feuchteren Klima selbst bei Temperaturen über 0° öfters eintritt. Während des Sommers sind die Niederschläge selten; die Pflanzen erhalten das nötige Wasser von der Feuchtigkeit des Bodens und der Schneeschmelze.

An der Westküste treffen wir nach den Berichten Bessels im Winter ebenfalls sehr spärliche Niederschläge an. In 7 Monaten, Nov. bis Mai, zählte man zu Polarisbay 335 Stunden mit Schneefall, zu Polarishaus 422 St., die Niederschlagsmenge für diese Zeit betrug dort 8^{mm}, hier 59^{mm}. Wenn auch der Niederschlag nicht jederzeit genau gemessen werden konnte, so würde selbst die Verdoppelung der gemessenen

Menge ein sehr geringfügiges Resultat ergeben. Solche geringe Niederschlagsmengen führen Bessel zu der Annahme, daß die gegenwärtigen Gletscher Nordgrönlands nur ein Überbleibsel aus früherer Zeit mit andern atmosphärischen Verhältnissen sind und jetzt abnehmen müssen. Helland sieht in der Größe des Areals, von welchem die Gletscher ihren Zufluß, die Ursache, warum das Land bei solcher geringer Niederschlagsmenge Gletscher nähren kann. In Port Foulke ($78^{\circ} 18' \text{ N. Br. } 13^{\circ} 00' \text{ W.}$) wiegen im Winter heitere Tage vor, im Sommer bewölkte. Von Dezember bis Februar kommen auf 54 heitere Tage, nur 6 bewölkte, im Juni und Juli auf 12 heitere Tage 31 mit bedecktem Himmel, im Wintersemester 41 Tage, im Sommersemester 60 Tage mit Niederschlag.

Auch der Winter von 1853/54 zeigte zu Rensselaer Harbor sehr geringe Niederschläge. Man findet in den Beobachtungsjournalen selten Schneefall angegeben, z. B. fehlt er vom 1. Jan. bis 14. Febr. und vom 1. bis 20. März, wohl aber sind viele Kalmen und klarer Himmel angemerkt. Niederschläge in der Form von Wassertropfen erscheinen allein im Juli, wo aber auch Schnee vorkam. Im Winter waren die Niederschläge hauptsächlich von ENE-, ESE- und SSE-Winden, d. h. aus den vom Golfstrom bespülten Teilen des arktischen Festlandes, begleitet, im Sommer aber von SSW- und WSW-Winden. Zu Polarisbay ist SW der feuchteste Wind, der die meisten Stunden mit Niederschlag hat. In den Monaten Juli bis September ist daselbst SW die mittlere Windrichtung; in dem andern Teile des Jahres schwankt dieselbe zwischen N und NE. In Südgrönland fällt Regen und Schnee in größerer Menge als in Nordgrönland, da jenes dem relativ warmen Atl. Ozean viel näher liegt und es gerade der Zusammenstoß der milden und feuchten Luft mit der kältern ist, der Niederschläge veranlaßt. Nach der allerdings nur kurzen Beobachtungszeit gibt es bei Julianshaab, $60\frac{1}{2}^{\circ} \text{ N.}, 47^{\circ} \text{ W.}$, im ganzen Jahre 57 Tage, an denen nur Regen und 75 Tage, an denen Schnee fällt, doch so, daß es an 13 der letzterwähnten auch zu gleicher Zeit regnete (Etzel). Bei Jacobshavn in Nordgrönland gab es dagegen nach 10jährigen Beobachtungen nur 26 Regen- und 58 Schneetage im Jahr und die jährliche Niederschlagsmenge beträgt nach den Beobachtungen im Jahre 1875 144^{mm} . Regen und Schnee zusammen geben bei Julianshaab für das Jahr ungefähr 970^{mm} Niederschlag ab, wovon die Hälfte als Schnee zur Erde gelangt. Hauptsächlich der SE führt gewöhnlich viel Regen mit sich, besonders wenn er nur von kurzer Dauer ist; weht er aber mehrere Tage hindurch mit voller Stärke, so pflegt er die Luft aufzuklären und ist dann sogar außerordentlich trocken, wie es auch bei dem

Schweizer Föhn der Fall ist. Er weht häufiger in den kälteren als in den wärmeren Monaten und fast immer als Sturm. Der Himmel ist am klarsten im März und Oktober; Niederschläge sind am häufigsten im Januar, am seltensten im August. Nebel herrschen in den Sommermonaten vor und besonders im August.

2. Parry-Inseln und Nachbarschaft im arktischen Archipel Amerikas.

Die vorherrschenden Winde auf der Melville-Insel sind entschieden Nordwinde, insbesondere von Januar bis März. Nach den daselbst im Jahre 1853 angestellten Beobachtungen betragen alle Winde der südlichen Hälfte der Windrose nicht einmal 10⁰/₀. In diesem Jahre regnete es an 22 Tagen 15 Stunden heftig, 100 Stunden lang weniger heftig und 106 Stunden lang fand Sprühregen statt. Infolge obiger Windverhältnisse können wir keine reichlichen Niederschläge erwarten.

Nach den von Capt. Sir John Ross im Boothia-Golf gemachten Beobachtungen ist die Seltenheit der Niederschläge und Häufigkeit der Kalmen im Winterhalbjahre bemerkenswert. Die Zahl der Niederschlagsstunden im Mittel von 21¹/₂ Jahren ist folgende: Winter 194, Frühling 283, Sommer 292, Herbst 398. Die geringste Zahl der Niederschlagsstunden hat der Februar mit 39. Regen fällt im Juni bis September, und zwar liegt das Maximum im Juli. Die Zahl der Stunden mit klarem Wetter erreicht ihr Maximum im Winterhalbjahre, indem dieselbe doppelt so groß als im Sommerhalbjahre ist.

In der Hudson Strait wurden von Capt. Sir G. Back zweistündliche Beobachtungen, August 1836 bis Juli 1837, angestellt. Dort zählte man 116 Tage mit klarem Wetter und 156 mit bedecktem Himmel; die Zahl der Tage mit Niederschlägen betrug 101, welche sich auf November bis April mit 40 und auf Mai bis Oktober mit 61 verteilen. Die wenigsten Tage mit Niederschlägen haben der Januar (4), März (4) und August (5).

Im Wellington-Kanal ist ebenfalls eine größere Anzahl der Niederschlagstage im Sommer- als im Winterhalbjahre zu verzeichnen. Während der 6 Wintermonate, mit April endigend, fiel Schnee bloß an 11 Tagen, im andern Halbjahre an 26 Tagen. Regen fiel an 9 Tagen, hauptsächlich im Juni, den meisten Nebel hatte der August. Im Northumberland-Sound hatte der Dezember das meiste klare Wetter und den wenigsten Nebel, der August war bedeckt und neblig, Schnee fiel an 41 Tagen. Im November und Dezember fiel kein Schnee und im Januar und Februar bloß an je einem Tage. Regen fiel an 8 Tagen im Juli, im August und Juni bloß an einem Tage.

Der ganze Archipel, einschliesslich Grönlands, doch mit Ausnahme von dessen Südspitze, gehört in das Gebiet der an Regen und Schnee armen Winter.

3. Britisch-Nordamerika.

Sehr dürftig sind die vorliegenden Beobachtungen im eigentlichen kontinentalen Teile von Britisch Nordamerika südlich bis zum Ende der Hudsonsbay.

Das Gebiet erhält seine atmosphärische Feuchtigkeit von jedem der 3 Meeresgebiete. Der westliche Teil, der sich an die Felsengebirge anschliesst, wird mit atmosphärischem Wasser vom Stillen Ozean, der südliche innere Teil vom Golfe und der östliche und nördliche vom Atlantischen Ozean und dem nördlichen Eismeere versorgt.

Das Gebiet der regen- und schneearmen Winter erstreckt sich ungefähr bis zur Mitte der Hudsonsbay, von wo in südlicher Richtung reichlicherer Schneefall anzutreffen ist. Am Mackenzie ist der Himmel im Winter meist unbewölkt und die Luft ruhig; starke Winde sind selten.

Über das Winterklima an der Hudsonsbay bei York Factory besitzen wir von Dr. John Rae einige Notizen, welche sich über den Zeitraum von November 1845 bis April 1846 erstrecken. Die Tiefe des Schneefalles gibt Rae an im November zu 241,3, Dezember 44,5, Januar 520,7, Februar 101,6, März 889 und April 381^{mm}. Die Luft, sagt Ellis in seiner Voyage to Hudsonsbay, ist in dieser Gegend niemals oder doch nur selten klar. Im Frühling und Herbst sind nasse Nebel häufig und im Winter ist die Luft von feinen Eisnadeln angefüllt, besonders, wenn der Wind von N oder E kommt, und strenger Frost herrscht. Wo immer das Wasser frei von Eis ist, steigt ein dichter Nebel auf, Frostrauch genannt. Der Schneefall war am seltensten bei Westwind.

Dr. John Rae überwinterte 1846/47 in Repulsebay und 1853/54 in Fort Hope. Die Resultate seiner Beobachtungen sind, daß Dunst und Nebel im Winter häufig sind, nebligcs Wetter aber auch zumeist im Juli vorherrscht. Die höchsten Temperaturen traten bei SE ein, mit Schnee oder Regen, im Sommer aber bei heiterem Wetter. Der vorherrschende Wind war das ganze Jahr hindurch N bis NW und derselbe wehte mit großer Stärke.

Im Südwesten der Hudsonsbay sind die Niederschlagsmengen noch gering; sie betragen zu Norvay House 484^{mm}, wovon das Maximum im Sommer und Herbst und das Minimum im Frühling fällt. Nach Westen zu wächst die Niederschlagsmenge, besonders die des Sommers. Gemeinsam mit der höheren Temperatur ruft dieser reiche Sommerregen in diesem

Gebiete eine auffallend üppige Vegetation hervor und gestattet stellenweise sogar noch den Maisbau. Auf den Prairien unmittelbar im Westen vom Red River Settlement bis nach Turtle Mountain sind Gewitter mit heftigen Regen bei Südwestwind während der Monate Juli und August fast eine tägliche Erscheinung, während sie auf den hochgelegenen im Westen nur selten wahrgenommen werden, doch fällt noch ziemlich Regen. In diesen an die Felsengebirge grenzenden Territorien kommt der Südwest durch die Einsenkungen der Gebirge und bringt Regen.

Am Winnipeg sind die Niederschläge im Winter noch außerordentlich gering den andern Jahreszeiten gegenüber. Von der Jahresmenge mit 583^{mm} entfallen auf den Winter nur 60^{mm}, während der Frühling 165, der Sommer 242 und der Herbst 116^{mm} hat.

Die canadischen Winter sind durch ihren Schneereichtum bekannt. Zu Toronto fallen jährlich von November bis April 1570^{mm} Schnee. Diese großen Schneefälle sind fast durchweg von Winden aus NE und E begleitet. Obgleich Toronto unter der geographischen Breite von Florenz liegt, kann selbst noch im Juni Schnee fallen, was sich am 3. und 4. Juni 1859 bei Wind aus N 52° W ereignete. In St. Martins bei Montreal zählt man im Jahre 43 Schneetage, 95 Regentage. Die Schneemenge der kälteren Jahreszeit beträgt im Mittel 2330^{mm}. Obgleich in Nordamerika der Polarstrom oder die Landwinde aus NW und W entschieden die Vorherrschaft haben, ist der jährliche Gang der relativen Feuchtigkeit, wenigstens in den östlichen Teilen, derselbe wie in Europa. Wir bemerken nur eine etwas grössere Lufttrockenheit Nordamerikas Europa gegenüber, welche den vorwiegenden Landwinden zugeschrieben werden muß. (Hann: Untersuchungen über die Winde der nördlichen Hemisphäre und ihre klimatologische Bedeutung). Nach den Windrosen der Feuchtigkeit und Bewölkung für Toronto erniedrigen W und NW im Winter wie im Sommer die Feuchtigkeit beträchtlich; NW und N bringen Winter und Sommer die grösste Heiterkeit, während SE, E, NE im Winter und NE, SW im Sommer die Regenwinde sind. Im Sommer und Winter ist also die Richtung, aus welcher die Regenwinde kommen, eine entgegengesetzte.

Je mehr wir uns der Ostküste Nordamerikas nähern, um so reichlicher werden naturgemäfs die Niederschläge, von denen das Maximum noch in den Sommer fällt. Montreal verzeichnet eine jährliche Menge von 1062^{mm}, nämlich für den Winter 277^{mm}, den Frühling 242^{mm}, den Sommer 264 den Herbst 279^{mm}.

An der Küste östlich von Labrador überwiegen die Herbstregen die Sommerregen; im allgemeinen sind aber die vier Jahreszeiten gleichmäßig mit Niederschlägen versorgt. St. Johns, New Foundland, zeigt per Jahr 1480^{mm}, im Winter 315^{mm}, Sommer 354, Herbst 510, Frühling 300^{mm}. New Foundland ist wegen seiner Nebel berüchtigt. Sie finden sich zu allen Jahreszeiten, sind aber am häufigsten im Juni und Juli, herrschen an der Süd- und Ostküste vor und erstrecken sich selten landeinwärts. Bei östlichen Winden sind sie am häufigsten, bei Westwinden nicht so häufig und von kurzer Dauer. Die Nebel bei Ostwind erstrecken sich hoch über die See und können nicht von dem Mastkorbe eines Schiffes übersehen werden. Nebel bei Kalmen, besonders nach heftigen Winden, sind oft so dicht, daß sie ein Schiff selbst auf Stimmweite verbergen; aber sie gehen nicht weiter als 45 m in die Höhe. Nordwärts von Bonavista sind Nebel nicht so häufig als an den andern Küsten, und an der Westküste sind sie eine seltene Erscheinung. (New Foundland Pilot 1878.)

Die Atmosphäre von Prince Edward Island ist frei von Nebeln, und selbst eine nebelige Nacht gehört zu den großen Seltenheiten. Die Ursache der Abwesenheit von Nebel ist darin zu suchen, daß das Wasser um Prince Edward Island nicht in unmittelbaren Kontakt mit dem von einer verschiedenen Temperatur kommt und daß Cape Breton und New Foundland, beide mit hohen Bergen besetzt, sie vom Atlantischen Ozean trennen und die Nebel abhalten.

Nahe der Südküste von Nova Scotia und New Foundland ist die Niederschlagsmenge durch das Zusammentreffen von Polar- und Golfströmung exzessiv und variiert zwischen 1250—1520^{mm}, während sie in einer Entfernung von 320—580 km von der Küste weniger als 1015^{mm} beträgt. Hancock Barracks, Houlton, 46,07 N. Br., 67,49 W. L., haben 939^{mm} Niederschlag, wovon 302^{mm} im Sommer fallen. Mit dieser Station sind wir in das folgende Gebiet eingetreten.

4. Vereinigte Staaten.

Das große Gebiet der Vereinigten Staaten empfängt seine atmosphärische Feuchtigkeit gleichfalls von dem Atlantischen Ozean, dem Golfe von Mexiko und dem Stillen Ozean.

a) Atlantisches Gebiet.

Aus dem erstern erhalten nur die nördlich und nordöstlich von Virginien gelegenen Staaten ihren Niederschlag, bei weitem der größte Teil der Vereinigten Staaten von den Rocky Mountains bis zu den großen Seen, sowie die Südstaaten erhalten ihren Regen vom Golfe, die pacifischen Staaten,

d. h. die ganzen westlich von den Rocky Mts. gelegenen Gebiete, sind auf den Stillen Ozean als Regenspender angewiesen.

Charakteristisch für die Ostküste ist, daß von New Hampshire im Norden bis Florida im Süden sich die Prozentzahl der Sommerregen steigert und diejenige der Winterregen sich verringert und ferner daß die Jahresmenge von Norden nach Süden zunimmt. Die Ursache davon ist, daß an der Küste der nördlichen Oststaaten ein kalter Meeresstrom von Norden nach Süden fließt, also die darüber lagernde Luft relativ dampfarm ist, während der Küste von Florida bis Virginien entlang der warme Golfstrom fließt, über welchem Luft von hoher Dampfsaturation lagert.

In den nördlichen Oststaaten nimmt die Regenmenge von der Küste nach dem Innern rasch ab. Die Kondensation der Wasserdämpfe des Atlantischen Ozeans erreicht ihr Maximum schon in unmittelbarer Nähe der Küste und die Hauptmasse fällt schon nieder längs der Küste von Maine, wo Eastport und Portland 1115^{mm} Niederschlag haben, in Zentral-Connecticut, im westlichen Massachusetts, im südlichen Vermont und nahe der Chesapeakebay. Ein schmaler Streifen von 1120^{mm} zieht sich von Maine nach Pennsylvanien der Küste entlang; es folgt dann ein analoger Streifen von 1000^{mm}, dem sich zwei andre von 900^{mm} und 800^{mm} anschließen, welcher letzterer an den Ontariosee grenzt. In Maine hat die Niederschlagsmenge zwei Maxima in der jährlichen Periode, nämlich im Mai und November, und ein Minimum im Februar oder März. Auffallend ist, daß auf den Bergen Pennsylvaniens und Virginien sich die Regenmenge beträchtlich vermindert, was im Gegensatze zu den Gesetzen des Regensfalls in Europa steht. Nur die von SE nach NW verlaufenden Gebirge üben auf die äquatorialen Luftströme einen eigentlich hemmenden Einfluß und vermehren dadurch die Regenmenge. Dies findet aber in Nordamerika nicht statt.

An der Ostküste von Nordamerika nimmt die Häufigkeit der Polarwinde nach Süden etwa bis zum 32. Parallel ab, hierauf tritt wieder eine entschiedene Zunahme derselben ein.

In bezug auf die Winde als Regenbringer ergibt sich folgendes: Im östlichen Nordamerika tritt im Winter die Ostseite der Windrose entschieden als die Regenseite auf, im Sommer zeigt sich ein zweites Maximum der Regenwahrscheinlichkeit bei SW, sowie wir uns von der Küste selbst entfernen, und in Marietta, jenseits der Alleghanies, ist nur das einzige Maximum bei SW vorhanden. Im Winter aber ist auch dort noch der E und SE der eigentliche Regenwind. (Hann: Untersuchungen über die Winde der nördl. Hemisphäre.)

b) Golfgebiet.

Wie schon erwähnt wurde, ist der Teil der Vereinigten Staaten, welcher seine atmosphärische Feuchtigkeit vom Golfe von Mexiko empfängt, der größte, indem er sich von hier bis an die großen canadischen Seen und vom Felsengebirge bis zum Atlantischen Ozean erstreckt, die Staaten, welche nördlich und nordöstlich von Virginien liegen, ausgenommen.

Die jährliche Verteilung des Niederschlags zeigt deutlich, daß sich zwischen Alabama und Mississippi die vom Golfe kommenden und Feuchtigkeit spendenden Luftströmungen teilen, indem ein Ast nach NW zum Depressionsgebiet der westlichen Union, der andre zum nordatlantischen Minimum zieht.

Betrachten wir zuerst die östlich von den Alleghanies gelegenen Staaten. Die jährliche Regenmenge nimmt hier von Norden nach Süden zu und schwankt zwischen 1016^{mm} und 1524^{mm}. Besonders werden von New Hampshire bis nach Florida die Sommerregen ergiebiger. In Fort Monroe (Virginia) ist das Verhältnis der Niederschlagsmengen folgendes: Winter 22 0/0, Frühling 21 0/0, Sommer 33 0/0, Herbst 23 0/0, in Charleston, Süd-Carolina: Winter 20 0/0, Frühling 18 0/0, Sommer 39 0/0, Herbst 23 0/0, Fort Brooke, Florida, Winter 15 0/0, Herbst 23 0/0, Sommer 51 0/0, Herbst 18 0/0. Aus diesen Daten geht deutlich die Zunahme der Sommerregen und die Abnahme der Winterregen von Süden nach Norden hervor. Dieses Fehlen der subtropischen Regenzone im östlichen Nordamerika hat Dove durch eine jahreszeitliche Verschiebung des Passats erklärt, wodurch die Bedingung zur Entstehung einer subtropischen Regenzone wegfällt. Die vorherrschenden Winde sind in diesem Teile die SW-Winde, d. h. die Luftströmungen vom Golfe her, der unter den Breitengraden gelegen ist, wo auf dem Meere überhaupt der höchste Luftdruck herrscht. Florida, welches fast ganz eben ist, zeigt scharf begrenzte Gebiete von größerm und geringerm Regenfall. Das Maximum von 1523^{mm} zieht sich von der Südostseite nach dem Innern zu und verdankt sein Dasein der Nähe des Golfstromes. Hier finden wir das Maximum des Niederschlags während des Sommers mit 712^{mm}, während in Virginien nur 12^{mm} Regen fällt. Florida reicht in die regelmässige Regenzeit der Tropen; das Maximum des Niederschlags tritt ein, einen Monat, nachdem die Sonne ihre größte nördliche Deklination erreicht hat.

Auf der Nordseite des Golfes, mit Ausnahme der Staaten Alabama und Mississippi, wo das Maximum der Niederschläge im Winter und Frühling eintritt, nehmen nach Norden die sommerlichen Niederschläge zu und diejenigen des Winters ab, da im nördlichen Teile des Mississippibeckens die Polarwinde im Winter vorherrschen. Den Grund, warum gerade

die sommerlichen Niederschläge vorzüglich in dieser Richtung wachsen, sieht Woeikof (Die atmosphärische Zirkulation) darin, daß durch die Auflockerung der westlich liegenden Wüsten die Luft des Mexikanischen Meerbusens als Süd und SE dorthin ziehen muß. Nördlich und nordöstlich aber vom Mexik. Meerbusen ist keine so bedeutende Auflockerung; hingegen sind vorzüglich in Alabama und Mississippi die SW-Winde des Winters und Frühlings regenbringend; denn die schnell gegen das Innere wirkende Temperatur, wie auch die Ausläufer der Alleghanies bewirken die Kondensation der Wasserdämpfe, welche eine jährliche Niederschlagsmenge von 1600^{mm} ergibt.

Nach Schotts Rain-Charts of the United States erfolgt im Winter ein beträchtlicher Niederschlag über Arkansas und den angrenzenden Teilen von Missouri; das andre Maximum im Osten vom Mississippi teilt sich zwischen dem 32.° und 33.° N. Br. in zwei Äste, von denen der eine an der Ostseite der Alleghanies bis nach Nord-Carolina hinstreicht mit einem Betrag von 300^{mm} und der andre an der Westseite, indem er 500^{mm} in Alabama, 450^{mm} in Tennessee, 400^{mm} in Kentucky und 300^{mm} in der Nähe des Ohio zur Erde sendet. Im Gebiete des Tennessee und Ohio sind die Äquatorialwinde im Winter durchschnittlich häufiger als irgendwo in der Union, mit Ausnahme der pacifischen Staaten. Ihr Minimum fällt in den Frühling, ihr Maximum in den Sommer.

Die Winde streichen über das Mississippidelta aus der Richtung SE; nachdem dieselben den 33.° erreicht haben, werden sie mehr südlich und weiter nördlicher in Illinois südwestlich, und ihre Richtung wird westlich nahe am Lake Michigan. Betrachten wir als Typus der eben geschilderten Region St. Louis hinsichtlich der meteorischen Verhältnisse. Die jährliche Regenmenge beträgt 1071^{mm}, eine beträchtliche für eine so kontinentale Lage! Das Maximum fällt im Mai und Juni, das Minimum im Januar. Schnee fällt von November bis März; im Oktober kamen in 23 Jahren zweimal, im April fünfmal Schneefälle vor. Der meiste Schnee fällt im Januar als Wasser gemessen 16^{mm} im Jahresmittel 61^{mm}. Doch bleibt er selten länger als eine, höchstens zwei Wochen liegen. Sehr zahlreich und heftig sind die Gewitter, durchschnittlich 40 im Jahre.

Im nördlichen Indiana und Illinois, sowie dem nordöstlichen Jowa finden wir einen Strich, der sich bis in das Innere von Minnesota ausdehnt, mit einem Maximum von 400^{mm} im Sommer. Dieses rührt vom Lake Michigan her, um dessen Umgebungen im Sommer 300—500^{mm} Regen fällt.

An diese wohlbewässerten Teile der Union schließt sich die große regenarme Region von 98° bis 121° W. L. v. Gr.

an und umfaßt jenseits des Mississippi das Gebiet des großen Beckens, West-Texas, das Plateau der Felsengebirge und den größern Teil Californiens.

Im allgemeinen kann man in Nordamerika die Grenze des Ackerbaues ohne künstliche Bewässerung durch die Isohyete von 500^{mm} bezeichnen. Sie beginnt nach J. W. Powells Report on the lands of the arid region ungefähr 90 km westlich von Brownsville in Texas, verläuft bis zum 36.° N. Br. und 105° W. L. in nordwestlicher Richtung, biegt dann nach Süden bis 33½° um und verläuft dann ziemlich in gerader Richtung nordöstlich und trifft die nördliche Grenze der Union ungefähr 80 km östlich von Pembina in Dakota. Betrachten wir hier nur denjenigen Teil dieser an Niederschlägen armen Region, welcher dieselben noch vom Golfe erhält. Die Grenze bildet der Ostfuß der Felsengebirge. Alles westlich von ihr gelegene Gebiet wird vom Stillen Ozean mit meteorischem Wasser versorgt.

Die Staaten und Territorien, welche zwischen dem Ostfusse der Felsengebirge und westlich von der Isohyete 500^{mm} liegen, sind der östliche Teil von New Mexico, Colorado, West Nebraska, Dakota, Ost-Wyoming und West-Minnesota. Dem Ostfusse der Felsengebirge läuft so ziemlich die Isohyete von 300^{mm} entlang, so daß obige Staaten zwischen den Isohyeten von 300—500^{mm} liegen.

Da, wo die Frühlings- und Sommerregen vorwiegen, kann die jährliche Niederschlagsmenge von weniger als 500^{mm} für den Ackerbau hinreichen. Am südlichen Teile der Isohyete von 500^{mm} sind die Niederschläge ziemlich gleichmäßig über alle Jahreszeiten verteilt, aber im nördlichen Teile sind diejenigen des Frühlings und Sommers größer als die des Winters, und hier verläuft die Grenze der dürrn Region weiter nach Westen. Auch waltet hier noch ein andrer Umstand ob, nämlich der Temperaturgrad. Wo die Temperatur höher ist, ist mehr Regen für den Ackerbau nötig als da, wo dieselbe niedriger ist.

Es gibt außerdem noch 3 Distrikte, wo der Regenfall auf einige Monate konzentriert ist, und daher Ackerbau mit weniger als 500^{mm} Niederschlag gedeihen kann; von diesen liegen zwei an der Grenze der dürrn Region und eine innerhalb derselben.

In Texas sind 500^{mm} für den Ackerbau nicht hinreichend, während in Dakota und Minnesota ein geringerer Betrag genügt, da Texas einen gleichmäßigeren Regenfall in allen Jahreszeiten zeigt, während in Dakota die größte Menge im Sommer, dann im Frühling und die geringste im Winter fällt. In Dakota ist eine Regenperiode markiert, und 73% des Regens fällt im Frühling und Sommer. In Texas dagegen fällt nur 52% in der Ackerbauzeit. Die NW-Sommerwinde, von

dem nordpacifischen Ozean und der Beringsee, welche über den Kontinent streichen, gelangen rasch und ohne Hindernis nach Saskatchewan, und Assiniboine, Ost-Dakota und Minnesota. Hier treffen sie mit den feuchten Golfwinden zusammen, und die Folge davon ist, daß ein reichlicher Niederschlag erfolgt.

Die Beobachtungen zeigen, daß die Frühlingsregen sich progressiv von Norden nach Süden vermindern, während die Winterregen zunehmen, wodurch sich die Jahreszeiten mehr nähern, so daß eine Regenzeit in Texas nicht so ausgeprägt ist als in Dakota. Eine Gruppe von 8 Stationen in Dakota, Minnesota und Nebraska zeigt, daß 72% der Regen im Frühling und Sommer fallen, 65% in Kansas und in Texas nur 55%. Auf den Prairien fällt das Maximum im Juni, d. h. zu der Zeit, wo die Temperatur hoch, die Gräser und Cerealien noch grün sind. In Dakota ist das Maximum des Regens früher als in Texas und korrespondiert mehr mit dem Maximum der Temperatur. Die beiden andern Distrikte fallen in das pacifische Gebiet. Als eine bemerkenswerte Erscheinung und Folge der geringen Niederschlagsmengen ist die große Trockenheit und Klarheit der Luft in diesem Gebiete zu erwähnen.

Im östlichen Colorado ist die Bewölkung in allen Jahreszeiten gering, ganz besonders im Herbst. Im Hochsommer ist freilich etwas mehr Wolkenbildung vorhanden, namentlich im Gebirge. Auf dem Plateau existiert keine permanente Schneedecke im Winter, auch im Gebirge, bis etwa 2400 m Höhe, liegt der Schnee nicht den ganzen Winter, die Südseiten der Berge werden an dem ersten sonnigen Tage nach dem Schneefall entblößt. An der Westseite der Hauptkette fällt naturgemäß viel mehr Schnee als an der Ostseite.

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist in den einzelnen Monaten folgender: Dezember 40%, Januar 26%, Februar 17%, März 10%, April 36%, Mai 27%, Juni 20%, Juli 32%, August 30%, September 29%, Oktober 26%, November 25%.

Nach E. Loomis' Untersuchungen über die Temperaturschwankungen der Vereinigten Staaten beträgt unter 97° W. L. die relative Feuchtigkeit 65% und nimmt gegen das Felsengebirge hin bis unter 50% ab. Die feuchten Westwinde werden in hohem Grade ausgetrocknet, indem sie über die Sierra Nevada und die Rocky Mountains hinüber wehen, und kommen außerordentlich trocken an deren Ostabhang an. Weiter nach Osten nimmt die Dampfmenge, vom Golf von Mexiko heraufkommend, wieder zu.

c) Pacifisches Gebiet.

Die westlichen Teile von Nordamerika erhalten ihren Niederschlag von den ungeheueren tropischen Regionen des

Stillen Ozeans. Dort, wo die Temperatur hoch und die Oberfläche des Meeres weit ausgedehnt ist, findet eine starke Verdunstung des Wassers statt. Dieser Wasserdampf wird dann nordwärts durch den SW-Passat geführt, der von 30° N. Br. an nieder zu steigen beginnt und denselben landeinwärts führt. Es folgt daraus, daß an der Küste der Betrag der jährlichen Niederschlagsmenge abhängt von der Dauer der Südwestwinde. Dieselbe ist am längsten in den höheren Breiten, in der Nachbarschaft des 30.° N. Br. von nur wenigen Wochen. Demgemäß finden wir, daß in Sonora und Niedercalifornien die Regenperiode sehr kurz ist und die Menge nur 100 bis 130^{mm} beträgt. Weiter nördlicher wächst die Menge, indem sie zu San Diego 236^{mm}, zu San Francisco 545^{mm}, zu Astoria 1971 und zu Sitka 2075^{mm} beträgt. Wir bemerken hier das Gegenteil von dem, was an der atlantischen Küste stattfindet. An letzterer sind es Sommerregen, welche vorwiegen, an der pacifischen die Winterregen; an der atlantischen Küste nimmt die Regenmenge von Norden nach Süden zu, an der pacifischen von Süden nach Norden; an der atlantischen Küste finden wir das Maximum in Florida, an der pacifischen das Minimum in Californien. Während westwärts von der atlantischen Küste fast bis zum Fusse der Felsengebirge sich reichlicher Regenfall vorfindet, vermindert sich in kurzer Entfernung vom Ozean derjenige des pacifischen Gebietes sehr rasch, so daß wir mit 121° W. L. uns in Regionen befinden, wo die jährliche Menge bis unter 300^{mm} herabsinkt. Da mit Abnahme der Wärme die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, abnimmt, so wird die günstigste Gelegenheit für Regen geboten sein, wenn Luft, die über dem Meere der heißen Gegenden gestanden, über kältern Boden strömt. Da aber wegen der Drehung der Erde die Winde, welche von der heißen Zone herwehen, immer westlicher werden, je weiter sie fortschreiten, so wird in der gemäßigten Zone der nördlichen Hemisphäre die Südwestseite die Wetterseite sein. Die größte Menge des Niederschlags haben wir daher an den Westküsten der Kontinente zu erwarten und die mächtigsten Regen da, wo unmittelbar ein hohes Gebirge an der Küste sich erhebt. Diese Bedingungen erfüllen die Coast Range. Sobald die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft an diesen hinaufsteigt, verdünnt sie sich, erkaltet, die Feuchtigkeitskapazität nimmt ab und sie läßt einen großen Teil ihres Wassergehaltes als Regen oder Schnee fallen. Sobald diese Luft die Kammhöhe des Gebirges erreicht hat und an der Ostseite sich wieder senkt, erwärmt sie sich, ihre Feuchtigkeitskapazität nimmt zu und infolgedessen wird sie relativ trocken und ein Niederschlag kann nicht erfolgen.

Im Frühling, wenn den Südwestwinden Brisen aus West und Nordwest folgen, klärt sich das Wetter auf und die trockene Saison folgt und dauert durch gelegentliche Regenschauer unterbrochen bis zum Herbst. Die Sommerregen sind häufiger nach Nordwesten und verschwinden gänzlich südlich vom 41.° N. Br. an. In Californien begegnet man einem grossen Areal, wo kein Regen während der drei Sommermonate fällt, sogar in dem südlichen Teile finden wir nichts Analoges mit der Regenzeit in Georgia, was sich durch die Verschiedenheit der Windrichtung erklärt. An der atlantischen Küste, nördlich von 32° 30', wehen während des ganzen Jahres und im Sommer noch in höhern Grade die östlichen Passatwinde, während an der pacifischen Küste längs der Halbinsel Californien und nordwärts bis zum 41. Parallel nördliche und westliche Winde herrschen, woran die Meeresströmungen, welche an beiden Küsten eine entgegengesetzte Richtung einschlagen, einen nicht geringen Anteil haben. Die nordwestlichen Winde im Sommer an der pacifischen Küste kommen von einem kühlen Ozean, wo die Verdunstung gering ist und daher relativ kühl und trocken sind. Wie sie nun südlicher und landeinwärts gehen, erhöht sich ihre Feuchtigkeitskapazität, wodurch Regenfall unmöglich wird. Während der Sommermonate, von Anfang Juni bis Ende September, ja zuweilen bis in den Oktober, kommen in Californien nur ausnahmsweise längs des Küstenstriches leichte Regenschauer vor. Im Innern des Landes herrschen während dieser Zeit prachtvolle, fast wolkenlose Tage mit tiefblauem Himmel. Nach John S. Hittels Angaben in seinen *Resources of California* gibt es in Landstrichen, die mindestens $6\frac{1}{2}$ deutsche Meilen vom Meere entfernt liegen, durchschnittlich im Jahre 220 vollkommen klare Tage, an denen der Himmel nicht mit dem geringsten Wölkchen überzogen ist, 85 bewölkte und 60 Regentage. (R. von Schlagintweit: Californien.)

Der Umstand, dafs im mittlern und nördlichen Californien sich der Regenfall auf ein paar Monate im Winter sammendrängt, bedingt dort die Möglichkeit des Getreidebaues ohne künstliche Bewässerung, aber in der heifsen regenlosen Zeit verdorrt die Vegetation so rasch als sie entstanden ist, dem blühenden Grün folgt die ungeschminkte Erde! In folgedessen macht im Sommer auch der nicht zur Mohawüste gehörige Teil Californiens einen trostlosen Eindruck, den ein Besuch des von Touristen verherrlichten Yosemitehales mit seinen Riesenbäumen und Wasserfällen oder den künstlich bewässerten, von tropischer Pracht strotzenden Gärten des südlichen Californiens kaum zu verwischen vermag. Wiesen, nach unsrer Auffassung mit dickem Rasen und humusreicher

Erde, sind in Californien wie in den andern westlichen Staaten und Territorien nur in den höchsten Gebirgen anzutreffen.

Wie im Mittelmeergebiete, so ist auch in Californien das Klima für den tief wurzelnden, der sommerlichen Dürre trotzen- den und vom langen Herbst begünstigten Weinstock sehr günstig. Niedrige Temperaturen im Winter, wodurch die Reben zerstört werden, treten hier wie dort nicht auf; im Sommer aber entwickeln die Trauben infolge der Abwesenheit von Regen und starker Insolation einen großen Zuckergehalt.

Die Sierra Nevada und Cascade Range halten im Winter die SW-Winde auf, verdichten ihren Wasserdampf, der dann in Form von Schnee auf den Gipfeln und Abhängen niederfällt. Die größte Schneemenge wird man da finden, wo der Südwest zuerst und am vollständigsten aufgehalten wird, was in den höhern Teilen der Sierra Nevada zwischen 34—42° N. Br. der Fall ist. Die obere Schicht des feuchten SW-Windes, der über die Gipfel der Kette hinwegstreicht, ist trockener als die untere und hat nur so viel Feuchtigkeit behalten, um eine dünne Schicht Schnee über die inneren Plateaus und eine etwas dickere auf die Gipfel der Rocky Mountains abzulagern. Die Hochgebirge von Californien empfangen wahrscheinlich ihren ganzen Niederschlag in der Form von Schnee und fast ausschließlich in den Wintermonaten. In den mittlern Teilen des Staates schneit es selten, auch bleibt der Schnee an Orten von weniger als 900m Höhe nicht lange am Boden liegen. Weiter hinauf nach dem Gebirge nimmt der Schneefall rasch zu und an den Bergabhängen, besonders an den Cañons, häuft er sich in ungeheuren Massen, die in gewöhnlichen Jahren die Abhänge der Sierra bis auf 1200m herab in den Wintermonaten bedecken; auf den Pässen bleiben ansehnliche Massen bis Mai und Juni liegen. Das Schmelzen des im Winter angesammelten Schnees erhält den Bächen im Gebirge den Sommer hindurch die Wasserfülle und diese speisen wieder die Kanäle. Der in der Sierra aufgespeicherte Schneevorrat muß daher als ein kostbarer Schatz für Californien gelten, denn wenn der gesamte Niederschlag als Regen erfolgte, würde er sofort ablaufen und dabei noch zerstörende Überschwemmungen mit sich bringen, im Sommer aber würde Ackerbau unmöglich sein. (J. D. Whitney: Die Sierra Nevada, Californien, Peterm. Mitteil. 1870.)

Nach 9jährigen Aufzeichnungen in San Francisco beginnt dort die Regenzeit im Mittel der 9 Jahre am 28. November und währt bis zum 10. April. Der erste Regen fiel zwischen dem 14. September und 15. November, der letzte zwischen dem 12. Mai und 23. Juni, Mitte Januar wird als der Kulminations-

punkt der Regenzeit betrachtet. Die Menge ist auffallend wechselnd, sowohl in demselben Monat während verschiedener Jahre, als auch in betreff des Jahresniederschlags selbst. Die subtropischen Wirkungen dehnen sich südlich bis nach San Diego aus, im Kontraste mit den tropischen Regen in geringern Breiten an der atlantischen Küste. Im allgemeinen ist die Streichungslinie der Regen während des Winters eine südöstliche. In dieser Richtung verlaufen die Thäler des Sacramento und San Joaquin River, die Bay von San Francisco und das Thal des Sabin River. Diese südöstliche Richtung macht sich nur in den weitem Schichten der Atmosphäre geltend, denn in der Höhe sieht man in weiter Ferne die Wolken aus SW. und W. heranziehen und in der Regenzeit sind diese Wolkenzüge vorherrschend, selbst wenn unten der SE weht.

Wir müssen eine Depression des Luftdrucks im Sommer über den von hohen Bergen umringten Plateaus des westlichen Innern vermuten, namentlich in Utah. Im Juli existiert eine Zone niedrigen Luftdruckes über dem Felsengebirge nördlich von 38° etwa, dessen Axe ungefähr die Linie Salt Lake City, Virginia City bildet (758^{mm}). Der Luftdruck nimmt von hier nach E und SE zu, bis er unter 30° N. Br. etwa $764,5^{\text{mm}}$ beträgt, nach W zum Pacific steigt er gleichfalls bis über 763^{mm} . Denn wir sehen auf dem Plateau, wie auch im heißen untern Teile des Colorado, Südwinde sehr stark vorwalten, d. h. ein Zufluß von dem Golfe von Californien und teilweise auch in New Mexico vom mexicanischen Meerbusen, während im Winter nördliche Winde vorwalten, d. h. von dem kältern Innern mit seinem hohen Luftdrucke nach den Meeren. Im Januar finden wir drei Gebiete hohen Luftdruckes, eins im Felsengebirge unter 40° N. Br. und $108-114^{\circ}$ W. L. in der Gegend der Salzseestadt (768^{mm}), ein zweites gleichgroßes nordöstlich davon zwischen $96-86^{\circ}$ W. und $41-45^{\circ}$ N. Br. und ein drittes über den Staaten der Golfküste und den südlichen atlantischen Staaten (767^{mm}). Wir finden daher in Arizona und New Mexico im Sommer eine größere Regenmenge als in westlicher und in nördlicher Richtung bis zum untern Columbia. Dies ist der zweite jener soeben erwähnten Distrikte, wo bei einem jährlichen Niederschlage von weniger als 500^{mm} Ackerbau möglich ist. Zu Camp Grant hat der Sommer 41% des jährlichen Regenfalles von 383^{mm} und derselbe schwankt in Arizona im Sommer zwischen 41 bis 48% bis zum $112\frac{1}{2}^{\circ}$ W. L. von Gr., von wo derselbe wieder abnimmt; so beträgt er in Camp Mohave nur 27% im Sommer, wo sich das Wintermaximum der pacifischen Küste behauptet. Der dritte Distrikt ist die San Francisco-Region, wo 60% des Regens im Winter und 25% im Frühling fällt.

Ackerbau ist im Winter infolge der mittlern Wintertemperatur von 10° C. möglich.

In Utah ist der Ackerbau von Bewässerung abhängig. In den höhern Gegenden sind Striche von Wiesenland vorhanden, welche geringe Heuernten liefern; diese brauchen weniger Feuchtigkeit und empfangen wegen der Höhe ihrer Lage mehr Regen. In einem Gürtel zwischen dem Great Salt Lake und den Wahsatsch Mountains ist die lokale Regenmenge gröfser als die der Umgebung. Der Wasserdampf des Sees wird durch westliche Winde an die Berge im Osten gebracht und hier verdichtet.

Im östlichen Washington und Oregon und im nördlichen Idaho wird Ackerbau bis zu einem gewissen Grade, ohne Bewässerung getrieben. Der Niederschlag auf den Bergen ist gröfser als in der Niederung; nur die Hügel, die den grofsen Gebirgsmassen vorliegen, empfangen ein wenig von der Niederschlagsmenge der Gebirge.

In der Region des untern Columbia nimmt die Menge von der Küste nach dem Innern sehr rasch ab. Zu Astoria, Oregon, unter $123^{\circ}, 48'$ W. L., beträgt der Niederschlag 1971 mm , zu Fort Vancouver, Wash. Territory, $122^{\circ} 30'$ W. L., ist er schon auf 974 mm gesunken.

In Britisch Columbia finden wir dieselben Verhältnisse als in Wash. Territory und Oregon, und zwar je nach der Lage eine gröfsere oder geringere Niederschlagsmenge. Zu New Westminster beträgt sie 1533 mm , wovon 37% im Winter, 19% Frühling, 14% im Sommer und 28% im Herbst fallen. SW ist der Regenwind, der fast immer die Regenschauer des Frühlings und Sommers begleitet. Das Klima von Süd-Alaska ist hauptsächlich wegen seiner Bewölkung und Nebel berüchtigt. Der südlichste Punkt in dem Alexanderarchipel, von dem wir Aufzeichnungen besitzen, Fort Tongass, ist der nasseste, 3005 mm , das noch Sitka um 930 mm übertrifft. Dieselben zeigen ein vorherrschendes Maximum im Herbst, dem unmittelbar ein Minimum im Juli oder August vorhergeht. Tendenz zu einem zweiten Minimum ist im März vorhanden. In Fort Tongass haben die Sommermonate den wenigsten Regen, und von Oktober bis Januar fällt fast die Hälfte des jährlichen Niederschlags. Von Fort Wrangell sind die Berichte unvollkommen und unregelmäfsig, aber sie zeigen doch, dafs die jährliche Niederschlagsmenge geringer als in Sitka ist und ungefähr 1540 mm beträgt. Die Verteilung der Regen- und Schneetage für das ganze Jahr ist fast dieselbe wie in Fort Tongass, aber Schnee erscheint bis spät in den April. Bewölkung herrscht fast zu allen Jahreszeiten vor, aber der Winter ist die bewölkteste Jahreszeit; dort übertrifft die Nieder-

schlagsmenge des Herbstes von 626^{mm} diejenige des Winters von 398^{mm}.

Die Regenmenge von Sitka ist fast sprichwörtlich geworden, aber sie wird von der von Fort Tongass und Queen Charlotte Island und von der Gegend um Dixon Entrance übertroffen. Der Oktober zeigt das Maximum von 300^{mm}, der Juni das Minimum von 92^{mm}. Schwere Regen sind im Verhältnis selten, sie erfolgen meistens in der Form von Sprühtregen.

Von Sitka bis zur Halbinsel Alaska besitzen wir Notierungen allein auf St. Paul, Kadiak Island, und diese erstrecken sich nur auf 1 Jahr 5 Monate. Die Menge beträgt dort 1852^{mm}, wovon das Maximum auf den Frühling fällt. Ein vorherrschendes Sommerminimum ist im Juli und zwei fast gleiche Maxima im März und Dezember. Der September ist der bewölkteste Monat, dann folgt Mai und Dezember. In Iliuluk erfolgt der größte Niederschlag im Winter und während der Äquinoccien besonders bei Südostwinden als Schnee, der aber schnell auf den Bergen schmilzt. Nebel herrschen von April bis Mitte Juli bei SE- und NE-Winden, sind gewöhnlich stark und beständig und klären ebenso wie NE den Himmel auf. Von hier aus nimmt in nördlicher Richtung die Menge schnell ab, zu St. Paul Island beträgt sie 889^{mm}, gleich der zu Chicago und etwas weniger als zu New York oder Boston. SE-Winde sind warm und regnerisch, SW immer kälter als die SE und im Winter schneebringend. NE-Winde sind trocken und NW vermehren im Winter die Luftfeuchtigkeit. Charakteristisch ist ausser der geringen Wärmeschwankung die Trübung des Sommers, welche durch die um diese Zeit am häufigsten auftretenden Nebel veranlaßt wird.

Gleichwie die Temperatur nach dem Inlande schnell abnimmt, so geht auch Hand in Hand mit ihr die Abnahme des Niederschlags.

In grossem Kontraste zu der Niederschlagsmenge von Fort Tongass und Sitka steht diejenige von St. Michaels, wo sie nur noch 287^{mm} beträgt, wovon das Maximum schon auf den Sommer und das Minimum auf den Winter fällt. Die Zeit von Juli bis Oktober bringt wenigstens 4 Regentage in der Woche. Da im Winter im Süden der Alëuten die nord-pacifische Cyklone sich befindet, so schlagen die Südwestwinde, die von Juli bis Ende September wehen, meistens im Oktober in Nordwinde um und bringen schönes, kaltes Wetter.

Im nördlichen Alaska haben die Winde einen Monsuncharakter, sie wehen vom Lande (NE) im Winter, vom Meere

(SW) im Sommer. Zu Nulato mag der Schneefall von November bis Ende April 2,4m betragen, aber oft erreicht er die Höhe von 3,6m. Je weiter östlich, desto mehr nehmen die Winterniederschläge ab und die des Sommers nehmen zu; jenseits der nördlichen Ausläufer der Rocky Mountains, welche die dampfreichen Winde des Stillen Ozeans abhalten, so daß sie keinen Einfluß auf die meteorischen Verhältnisse des nördlichen Britisch Nordamerika ausüben können, dehnt sich das Gebiet der im Anfange besprochenen schneearmen Winter und der Sommerregen aus.

Anmerkung: Die Angaben der Niederschlagsmengen der in der folgenden Tabelle mit einem † bezeichneten Stationen sind aus J. W. Powells Report on the lands of the arid region berechnet. Alle übrigen, wenn nicht anderseitig bemerkt, beruhen auf Schotts Tables and results of the precipitation in rain and snow in the United States (Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. XVIII, Washington 1873). D. M. bedeutet S. 57: Dansk Meteorologisk Aarbog 1875. H. bezeichnet: Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, redigiert von Hann.

Niederschlag in Millimeter.

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst
Grönland.								
Van Rensselaer								
Harber 1 J. 8 M.	78° 37'	70° 53'	..	44 Tge	8 Tge	14	11	11
Port Foulke 11 M.	78 18	73 00	..	101 „	19 „	25	29	28
Polarisbay . . .	81 36	62 15	..	—	57 St.	243 St.	225 St.	—
Floeberg Beach 1 J.	82 27	61 22	..	—	265 „	287	360	370
Sabine-Insel 1 J.	74 32	18 49	..	635 St.	181	139	197	118
Discovery Bay . .	81 44	65 3	..	—	250 St.	236	156	332
M. { Ivikut 1 J. .	61 20	48 11	5	1168	192	139	280	557
Godthaab 1 J.	64 10	51 46	11	636	42	96	289	209
D. { Jacobshavn 1 J.	69 12	50 55	12	144	26	38	21	59
Upernivik 1 J.	72 48	56 0	4	340	88	129	58	65
Britisch-Nordamerika.								
Fort Peel's River								
8 M.	67 10	135 00	..	—	—	345	394	—
Ramah Labrador 2 J.	58 54	62 57	5	835	153	200	190	292
York Factory H. .	57 0	92 26	—	803	71	151	362	219
Winnipeg 9 J. H. 1883	49 55	97 07	226	583	60	165	242	116
Moose Factory 1 J.								
5 M.	51 15	80 45	10	723	113	128	271	211
Red River Settlement 1 J. 2 M.	49 05	97 00	200	—	—	—	631	—
Anticosti 8 J. . .	49 24	63 36	6	692	193	125	204	170
St. John's, New Foundland, 4 J. 8 M.	47 34	52 40	52	1481	315	300	355	510
St. John, New Brunswick, 4 J. 6 M.	45 22	66 04	41	1298	353	318	247	379
Point Lepréaux 6 J.	45 04	66 28	14	1028	258	250	249	271
Montreal 9 J. 6 M.	45 31	73 38	18	1062	277	242	264	279
Kingston 2 J. 2 M.	44 13	76 29	91	690	162	161	222	145
Toronto	43 39	79 23	104	893	208	212	232	240
New Westminster								
6 J. H. 1883 .	49 12	122 53	10	1572	607	339	191	435
Vereinigte Staaten.								
Alabama.								
Mobile 2 J. . .	30 41	88 02	4	1637	464	362	458	353
Huntsville 12 J. .	34 45	86 40	183	1394	392	358	370	254
Alaska. (Dall, Meteorology of Alaska.)								
Fort Tongass 2 J.								
4 M.	54 46	131 30	6	3005	942	646	392	1025
Sitka 30 J. 6 M.	57 03	135 19	5	2075	563	371	375	766
St. Paul, Kodiak Island, 1 J. 3 M.	57 47	152 20	6	1852	539	547	266	500
St. Paul Island 5 J.								
2 M.	57 07	170 17	15	889	251	145	225	268
St. Michaels 3 J.	63 28	161 48	9	287	31	33	127	96
Ikogmut	61 47	161 13	..	94 Tge	25 Tge	27	13	29
Fort Wrangell 2 J.								
8 M.	56 16	132 28	6	1538	398	259	254	627

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
Arizona.								
+ Camp Bowie 6 J.								
8 M.	32° 10'	109° 30'	1485	389	117	33	187	52
+ Camp Grant 6 J. 10 M.	32 54	110 40	1473	383	88	53	159	83
+ Camp Mc. Dowell								
8 J. 2 M. . . .	33 46	111 36	..	291	97	28	122	44
+ Camp Mojave 9 J. 1 M.	35 02	114 36	184	119	42	21	32	24
+ Camp Verde 6 J. 1 M.	34 34	111 54	966	276	65	32	118	61
+ Camp Whipple 7 J.								
5 M.	34 27	112 20	1137	489	131	98	205	55
+ Fort Defiance 8 J.								
5 M.	35 43	109 10	1981	361	65	52	150	94
Camp Goddwin 1 J.								
6 M.	32 52	109 51	..	833	301	82	183	267
Arkansas.								
Washington 21 J.								
9 M.	33 42	93 41	201	1389	356	397	328	308
California.								
+ Camp Independence								
8 J. 2 M. . . .	36 50	118 11	1463	168	115	28	9	16
+ Drum Barracks 5 J.								
5 M.	33 47	118 17	102	222	149	57	7	9
+ Fort Bidwell 8 J. 3 M.	41 50	120 10	1426	514	272	126	39	77
+ Fort Yuma 16 J. 6 M.	32 44	114 36	61	99	25	7	33	34
+ San Diego 24 J. 2 M.	32 42	117 14	46	236	131	48	9	48
+ Alcatraz Island 9 J.								
5 M.	37 49	122 25	..	419	306	66	0	47
+ Angel Isl. 5 J. 11 M.	37 51	122 26	9	472	312	90	0	70
+ Benicia Barracks								
18 J. 3 M. . . .	38 03	122 09	20	378	213	104	3	58
+ Fort Miller 6 J. 9 M.	37 00	119 40	122	483	224	184	0	75
+ Fort Point 14 J. 11 M.	37 48	122 29	8	441	289	93	1	58
+ Monterey 12 J. 3 M.	36 37	121 52	12	400	223	113	7	57
+ Sacramento 18 J. 3 M.	38 34	121 26	25	488	275	141	2	70
+ San Francisco Pre-								
sidio 20 J. 2 M.	37 47	122 28	46	515	313	122	12	68
+ San Francisco 24 J.								
2 M.	37 48	122 25	40	546	335	128	6	77
+ Camp Gaston 12 J.	41 01	123 34	..	1458	802	375	29	252
+ Camp Wright 9 J.								
8 M.	39 48	123 17	..	1117	693	210	7	207
+ Fort Crook 9 J. .	41 07	121 29	1033	590	287	162	25	116
+ Fort Humboldt. .	40 45	124 10	15	912	491	238	18	165
Colorado.								
+ Denver 5 J. 1 M.	39 45	105 01	1600	350	48	128	94	50
+ Fort Garland 13 J.								
1 M.	37 25	105 40	2397	377	64	83	170	60
+ Fort Lyon 7 J. 9 M.	38 08	102 50	1219	318	12	110	138	58
+ Fort Massachusetts								
5 J. 1 M. . . .	37 32	105 23	2550	437	57	79	141	160
Connecticut.								
New Haven. . .	41 18	72 57	13	1137	272	275	297	293

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
Dakota.								
† Fort Abercrombie 13 J. 6 M. . .	46° 27'	96° 21'	. .	477	47	122	220	88
† Fort Buford 7 J. 10 M.	48 01	103 58	579	300	51	95	103	51
† Fort Randall 15 J. 6 M.	43 01	98 37	379	394	30	120	158	86
† Fort Rice 6 J. 1 M. † Fort Stevenson 6 J. 2 M.	46 32	100 33	. .	289	34	92	124	39
† Fort Sully 7 J. 8 M. † Fort Totten 5 J. 5 M. † Fort Wadsworth 6 J. 5 M.	47 36	101 10	. .	301	33	87	126	55
† Fort Sully 7 J. 8 M. † Fort Totten 5 J. 5 M. † Fort Wadsworth 6 J. 5 M.	44 50	100 35	510	420	29	166	182	43
† Fort Totten 5 J. 5 M. † Fort Wadsworth 6 J. 5 M.	47 56	99 16	451	418	10	132	182	64
† Fort Wadsworth 6 J. 5 M.	45 43	97 10	503	613	74	178	260	101
† Pembina 4 J. 8 M.	48 57	97 03	233	394	39	102	184	69
District of Columbia.								
Washington 19 J.	38 54	77 02	53	963	198	252	283	230
Florida.								
Fort Brooke 17 J. Jacksonville 6 J. . Key West 12 J. 9 M.	27 57	82 26	6	1361	203	202	711	245
	30 20	81 39	6	1339	221	277	535	306
	24 33	81 48	3	1080	149	172	371	388
Georgia.								
Atlanta 2 J. . . . Savannah 23 J. 2 M.	33 45	81 24	320	1484	432	387	331	334
	32 05	81 06	13	1227	214	270	524	219
Idaho.								
† Fort Boise 9 J. 5 M. † Ft. Lapwai 9 J. 8 M.	43 40	116 00	609	393	169	131	29	64
	46 18	116 54	610	378	127	104	61	86
Illinois.								
Ottawa 10 J. 3 M. Athens 15 J. 11 M.	41 20	88 47	152	944	187	251	286	220
	39 52	89 56	244	1006	190	293	306	217
Indiana.								
Indianapolis 4 J. 2 M.	39 47	86 09	212	1138	222	375	217	324
Indian Territory.								
Ft. Arbuckle 9 J. 9 M. Ft. Gibson 20 J. 5 M.	34 29	97 17	305	830	138	202	276	214
	35 48	95 20	171	924	163	285	238	238
Iowa.								
Davenport 5 J. 6 M. Muscatine 12 J. H. Jowa City, 13 J. H. Ft. Dodge 1 J. 10 M. Des Moines City 1 J. 5 M.	41 30	90 39	224	1002	165	272	348	217
	41 26	91 05	179	1136	156	307	399	274
	41 37	91 30	190	1050	137	279	362	272
	42 31	94 12	287	680	65	201	207	207
	41 36	93 38	237	607	72	144	193	198
Kansas.								
† Ft. Riley 20 J. 10 M. † Fort Hays 6 J. 11 M. † Ft. Larned 10 J. 9 M.	39 03	96 35	396	623	67	140	266	150
	38 59	99 20	642	577	96	176	158	147
	38 10	98 57	589	544	42	131	245	126
Kentucky.								
Danville 8 J. . . . Chilesburg 9 J. . .	37 40	84 48	274	1159	303	327	324	205
	38 04	84 14	274	1187	335	301	301	250
Louisiana.								
New Orleans 15 J. 8 M. Baton Rouge 15 J. 1 M.	29 56	90 03	7	1294	297	278	428	291
	30 26	91 11	12	1528	394	347	471	316

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
Maine.								
Brunswick 32 J. .	43° 54'	69° 57'	22	1035	250	298	197	290
Hancock Barracks								
9 J.	46 07	67 49	189	939	190	193	303	253
Portland 3 J. 7 M.	43 39	70 15	26	1235	309	322	329	275
Maryland.								
Baltimore . . .	39 17	76 37	24	1129	243	294	336	256
Massachusetts.								
Worcester 26 J. .	42 16	71 49	161	1191	279	295	316	301
Michigan.								
Fort Brady 17 J. 7 M.	46 30	84 28	182	770	127	129	243	271
Marquette 7 J. 5 M.	46 32	87 35	216	762	162	165	229	206
Thunder Bay Isl.,								
7 J. 5 M. . . .	45 02	83 17	186	852	221	201	196	234
Minnesota.								
Sibley 7 J. 11 M.	44 30	94 25	..	628	100 ⁰ / ₀	21 ⁰ / ₀	40 ⁰ / ₀	29 ⁰ / ₀
Beaver Bay 6 J. 7 M.	47 12	91 18	387	690	114	200	217	159
Fort Ripley 16 J.								
10 M.	46 10	94 24	344	638	52	149	277	160
Minneapolis 1 J. .	44 58	93 15	261	695	65	95	371	164
St. Paul.	44 56	93 05	244	637	73	143	282	139
Mississippi.								
Columbus 4 J. 7 M.	33 31	88 28	69	1451	505	393	282	271
Natchez 8 J. . . .	31 34	91 27	80	1481	419	379	344	339
Vicksburg 14 J. 8 M.	32 23	90 50	106	1241	381	307	282	271
Missouri.								
Harrisonville 2 J.								
10 M.	38 38	94 25	..	1255	141	353	451	310
St. Louis 28 J. 3 M.	38 37	90 12	147	1070	194	315	340	230
Montana.								
+ Fort Benton 7 J.								
1 M.	47 50	110 39	832	337	45	136	114	42
+ Fort Shaw 7 J. 3 M.	47 30	111 42	1829	176	29	55	58	34
Helena City 1 J. .	46 45	111 50	1265	563	116	210	112	125
Fort C. F. Smith. .	45 20	107 56	..	333	66	90	44	133
Nebraska.								
+ Omaha Agency 5 J.								
2 M.	42 07	96 22	..	651	74	209	221	147
+ Fort Kearney 14 J.								
4 M.	40 38	98 57	719	641	37	198	283	123
+ Fort Mc. Pherson								
6 J. 9 M.	41 00	100 30	1136	482	32	175	192	83
Nevada.								
+ Camp Halleck 5 J.								
8 M.	40 49	115 20	1765	279	97	93	30	59
+ Camp Mc. Dermitt	41 58	117 40	1432	217	93	77	18	29
Fort Churchill 2 J.								
8 M.	39 17	119 19	1306	144	51	5	50	38
Fort Ruby 1 J. 4 M.	40 01	115 35	1805	438	107	133	76	122

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
New Hampshire.								
Stratford 9 J. 3 M.	44° 40'	71° 39'	305	1015	213	235	292	275
New Mexico.								
+ Albuquerque 12 J.								
2 M.	35 06	106 38	1534	206	23	21	110	52
+ Cantonment Burgwin 5 J. 9 M.	36 26	105 30	2408	220	44	40	74	62
+ Fort Bayard 7 J.								
6 M.	32 46	108 30	1356	363	83	39	183	58
+ Fort Craig 15 J.								
9 M.	33 38	107 00	1408	281	27	18	149	87
+ Fort Fillmore 8 J.								
3 M.	32 14	106 42	1200	214	19	12	106	77
+ Fort Mc. Rae 5 J.	33 18	107 03	1372	294	17	62	156	59
+ Fort Selden 8 J.								
5 M.	32 23	106 55	..	216	31	15	123	47
+ Fort Stanton 7 J.								
9 M.	33 29	105 38	1524	532	62	77	270	123
+ Fort Union 17 J.								
5 M.	35 54	104 57	2033	486	33	54	303	96
+ Fort Wingate 9 J. 1 M.	35 29	107 45	2128	440	138	50	165	87
+ Santa Fé 19 J. 10 M.	35 41	106 02	2085	379	63	55	173	88
New York.								
Albany 27 J. . . .	42 39	73 44	39	1033	219	248	313	261
Gouverneur 5 J.								
10 M.	44 20	75 27	122	938	213	212	219	294
Lowville 21 J. 8 M.	43 47	75 30	258	851	188	175	253	235
Madison Barracks								
6 J. 2 M.	43 57	76 04	79	857	165	192	247	253
Sacketts Harbor 7 J.								
6 M.	43 55	76 07	81	933	187	234	218	294
Buffalo 10 J. 8 M.	42 53	78 52	183	924	214	251	210	249
North Carolina.								
Fort Johnston 1 J.								
7 M.	33 55	78 01	6	1169	186	174	394	415
Ohio.								
Cincinnati 20 J. 2 M.	39 06	84 30	164	1191	284	308	348	251
Cleveland 10 J. 6 M.	41 30	81 42	196	907	171	224	269	243
Marietta 47 J. 11 M.	39 28	81 26	204	1085	242	276	324	243
Oregon.								
+ Camp Harney 6 J.	43 00	119 00	..	222	96	58	28	40
+ Camp Warner 5 J.								
3 M.	42 28	119 42	..	366	164	110	28	64
+ Astoria 22 J. 4 M.	46 11	123 48	16	1971	884	480	145	462
+ Fort Dalles 12 J. 8 M.	45 33	120 50	107	561	286	99	29	147
+ Fort Hoskins 6 J.								
9 M.	45 06	123 26	..	1694	876	373	67	378
+ Fort Stevens 6 J.								
5 M.	46 12	123 57	..	1996	884	449	200	463
+ Fort Umpqua 5 J.								
6 M.	43 42	124 10	2	1712	815	427	73	397

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
+ Fort Yamhill 9 J.								
3 M.	45° 21'	123° 15'	..	1412	683	333	61	335
+ Portland 7 J. . .	45 30	122 36	14	1198	499	349	63	287
Pennsylvania.								
Alleghany 22 J. 7 M.	40 29	79 59	214	895	189	239	260	207
Harrisburg 14 J.								
8 M.	40 16	76 53	114	1055	210	291	306	248
Philadelphia 30 J.								
3 M.	39 56	75 10	11	1091	249	269	308	265
Rhode Island.								
Providence 35 J.								
1 M.	41 50	71 24	47	1051	259	268	258	266
South Carolina.								
Charleston 19 J.								
7 M.	32 47	79 56	6	1065	192	228	414	231
Tennessee.								
Knoxville 1 J. 9 M.	35 56	83 56	305	1010	265	227	343	175
Glenwood 13 J.								
10 M.	36 28	87 20	146	1184	335	328	277	244
Texas.								
+ Austin 18 J. 8 M.	30 17	97 44	198	851	158	219	202	272
+ Camp Verde 5 J.								
9 M.	30 00	99 10	427	743	128	155	249	211
+ Fort Belknap 5 J.								
10 M.	33 08	98 46	488	713	98	163	240	212
+ Fort Bliss 14 J.								
3 M.	31 47	106 30	1167	217	31	11	89	86
+ Fort Brown 15 J.	25 50	97 37	15	709	103	81	194	331
+ Fort Chadbourne 8 J.								
7 M.	31 58	100 15	616	581	89	147	166	179
+ Fort Clark 12 J.								
5 M.	29 17	100 25	305	574	111	105	192	166
+ Fort Davis 8 J.								
11 M.	30 40	104 07	1432	435	46	47	222	120
+ Fort Duncan 11 J.								
7 M.	28 39	100 30	445	541	67	90	218	166
+ Fort Griffin 5 J.								
3 M.	32 54	99 14	..	547	106	126	159	156
+ Fort Inge 7 J. 4 M.	29 10	99 50	257	648	90	137	246	175
+ Fort Mason 5 J. 1 M.	30 40	99 15	366	736	101	161	265	209
+ Fort Mc. Intosh								
14 J. 7 M. . . .	27 35	99 48	246	445	60	82	167	136
+ Fort Mc. Kavett								
9 J. 7 M. . . .	30 48	100 08	628	608	107	132	171	198
+ Fort Stockton 5 J.								
8 M.	30 20	102 30	1509	292	33	31	144	84
+ Galveston 6 J. 1 M.	29 18	94 47	9	1449	310	334	378	427
+ Gilmer 7 J. 9 M.	32 40	94 59	290	1168	278	339	252	299
+ New Braunfels 5 J.								
1 M.	29 42	98 15	219	700	108	193	175	224

Stationen.	Breite.	Länge.	Höhe.	Jahr.	Winter.	Frühl.	Sommer.	Herbst.
+ Ringgold Barracks 14 J. 2 M. . . .	26° 23'	99° 00'	159	497	66	94	178	160
+ San Antonio 10 J. 2 M.	29 25	98 25	183	795	161	172	226	236
Fort Graham 3 J. 6 M.	32 00	97 21	274	1031	302	304	176	248
Utah.								
+ Camp Douglas 10 J. 3 M.	40 46	111 50	1531	478	158	183	55	82
+ Salt Lake City 9 J. 2 M.	40 46	111 54	1382	630	192	159	159	120
Vermont.								
Craftsbury 10 J. 7 M.	44 40	72 23	335	996	197	219	310	270
Burlington 27 J. 1 M.	44 28	73 12	105	868	145	189	282	252
Virginia.								
Richmond 2 J. 9 M. Fort Monroe 19 J. 4 M.	37 32	77 26	52	972	148	317	351	156
	37 00	76 18	2	1194	271	258	389	276
West Virginia.								
Kanawha	38 53	81 25	. .	885	253	234	229	169
Washington Territory.								
+ Fort Colville 11 J. + Fort Walla - Walla 8 J. 8 M. . . .	48 42	118 02	598	357	123	92	77	65
	46 03	118 20	244	491	193	119	53	126
+ Cape Disappoint- ment 5 J. 9 M. + Fort Steilacoom 12 J. 9 M.	46 17	124 03	9	1810	758	380	152	520
	47 11	122 34	91	988	432	228	71	257
+ Fort Vancouver 16 J. 11 M.	45 40	122 30	15	974	425	221	96	232
+ Fort Townsend 5 J. 6 M.	48 07	122 45	2	408	103	139	107	59
+ San Juan Isl. 9 J. 4 M.	48 28	123 01	46	719	275	127	117	200
Wisconsin.								
Manitowoc 4 J. 1 M. Superior City 7 J. 9 M.	44 07	87 46	200	769	141	158	282	188
	46 44	92 13	207	651	81	156	220	194
Wyoming.								
+ Fort Bridger 12 J. 10 M.	41 20	110 23	2029	214	43	76	52	43
+ Fort D. A. Russel 5 J. 1 M. . . .	41 12	104 50	. .	358	38	121	116	83
+ Fort Fettermann 5 J. 7 M.	42 50	105 29	1516	384	89	114	105	76
+ Fort F. Steele 5 J. 5 M.	41 47	106 57	2085	390	109	116	88	77
+ Fort Laramie 17 J. 8 M.	42 12	104 31	1363	367	50	136	112	69
+ Fort Sanders 6 J. 10 M.	41 17	105 36	2183	291	36	90	106	59


Verzeichnis der Quellen.


- Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. VI, XVIII, XXI.
 Zeitschrift der Österreich. Gesellschaft für Meteorologie, Band I—XVII.
 Dall: Alaska and its resources.
 Dall: Meteorology of Alaska.
 Petermanns Mitteilungen und Ergänzungsheft 38.
 Robert v. Schlagintweit: Californien.
 Rühl: Californien.
 Etzel: Grönland.
 Bessel: Amerikanische Nordpolexpedition.
 Roemer: Texas.
 H. Meidinger: Canadas rasches Aufblühen.
 Clever: Neu-Mexico.
 J. S. Kleinschmidt: Der neue Nordwesten.
 H. Hoffmann: Californien, Nevada und Mexico.
 Dove: Klima von Nordamerika.
 Thomas Spence: Manitoba et le Nord-Ouest du Canada.
 Alex. Batfray: British Columbia.
 Ratzel: Nordamerika I.
 Hann: Untersuchungen über die Winde der nördlichen Hemisphäre.
 M. F. Klauke: British Columbia and Vancouver Island.
 Robert v. Schlagintweit: Die Prairien des amerikanischen Westen.
 S. Garfield: Climates of the Northwest.
 J. W. Powell: Report on the lands of the arid region of the United States.
 Olshausen: Der Staat Missouri.
 Olshausen: Der Staat Jowa.
 Horace Austin: Minnesota, its resources and progress.
 Mühry: Deflection eines Windes.
 New Foundland Pilot 1878.
 M. Gregors: British America.
 Contributions to our Knowledge of the Meteorology of the Arctic regions I.
 Supan: Statistik der unteren Luftströmungen.
 Dove: Einfluß der Richtung der Gebirge auf die Regenmenge.
 Annual Reports of the United States geological survey of the territories.
 Dansk Meteorologisk Aarbog 1875.
 Blodget: Climatology of the United States.
 Hector: Physical features of the Central part of British Nord America.
 Mühry: Klimatographische Übersicht der Erde nebst Supplement.
 Forster: The Mississippi Valley.
 F. Zürcher: Der grönländische Föhn (La Nature 1878).
 The American Journal of Science, Vol. XIX.
 Dove: Über die Dämmerung der Wärme in der Winternacht der Polarländer.
 Mühry: Meteorologie der Polarzone.




JSOTHEREN.








NEN.






EN.



JÄHRLICHE NIEDERSCHLÄGE



SMENGE in Millimeter.



